

# ЛІКУВАННЯ COVID-19

## СТИСЛИЙ ПОСІБНИК

Тип лікування COVID-19	Доконтактна профілактика	Моно-клональні антитіла	Пероральні антивірусні препарати	Внутрішньо-венні антивірусні препарати
Доступні препарати	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
Кому підійде?	<p>Пацієнти дорослого й дитячого віку (від 12 років і старше, вагою від 40 кг), які:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• наразі не інфіковані вірусом SARS-CoV-2 (COVID-19);</li> <li>• останнім часом не контактували з особою, інфікованою вірусом SARS-CoV-2 (COVID-19);</li> <li>• страждають на помірну або тяжку форму імунної недостатності;</li> <li>• мають протипоказання до використання вакцин від COVID-19.</li> </ul>	<p>Пацієнти дорослого й дитячого віку (від 12 років і старше, вагою від 40 кг), які:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перебувають у групі високого ризику тяжкого перебігу COVID-19, зокрема госпіталізації або смерті.</li> </ul>	<p><b>Paxlovid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пацієнти дорослого й дитячого віку (від 12 років і старше, вагою від 40 кг).</li> </ul> <p><b>Lagevrio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дорослі, які перебувають у групі високого ризику тяжкого перебігу COVID-19, зокрема госпіталізації або смерті;</li> <li>• дорослі, яким не рекомендовані альтернативні варіанти лікування від COVID-19 або які не мають доступу до інших видів лікування COVID-19.</li> </ul>	<p>Пацієнти дорослого й дитячого віку (від 12 років і старше, вагою від 40 кг), які:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• госпіталізовані;</li> <li>• не госпіталізовані й перебувають у групі високого ризику тяжкого перебігу COVID-19, зокрема госпіталізації або смерті.</li> </ul> <p>Пацієнти дитячого віку вагою від 3,5 до 40 кг або пацієнти дитячого віку до 12 років, вагою від 3,5 кг, які:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• госпіталізовані;</li> <li>• не госпіталізовані й перебувають у групі високого ризику тяжкого перебігу COVID-19, зокрема госпіталізації або смерті.</li> </ul>
Коли приймати?	Через 2 тижні після вакцинації	Протягом щонайбільше 7 днів після отримання позитивного результату тесту на COVID-19	Протягом щонайбільше 5 днів після отримання позитивного результату тесту на COVID-19	Протягом щонайменше 7 днів після отримання позитивного результату тесту на COVID-19
Де дістати?	Медичні працівники	Медичні працівники	Медичні працівники, місцеві аптеки	Стаціонарні медичні установи

Додаткову інформацію можна отримати на сайті [hhs.gov](https://www.hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 Ukrainian

Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте за номером 1-800-525-0127. Якщо ви маєте вади слуху, зателефонуйте за номером 711 (Washington Relay) або надішліть листа на адресу ел. пошти: [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).