

ሄፕታይቲስ B ቢኖርብዎት እና ነፍሰ ጡር ቢሆኑ የልጅዎን የእርስዎን ጤንነት እንዴት ይጠብቃሉ



ሄፕታይቲስ B ልጅዎ በህይወት ዘመኑ ሁሉ ሊሸከመው የሚችለው ከባድ ህመም ነው። ነፍሰ ጡር ከሆኑ እና ሄፕታይቲስ B ካሉብዎት፣ ቫይረሱ በወሊድ ጊዜ በደም ንክኪ አማካኝነት አዲስ የተወለደ ልጅዎን ሊበክል ይችላል። ልጅዎን ከኢንፌክሽን ለመከላከል እና የራስዎን ጤና ለመጠበቅ፣ በእርግዝናዎ ወቅት የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን በጊዜ አግኝተው ስለ ሄፕታይቲስ B ያነጋግሯቸው።

በእርግዝና ወቅት እና ከዚያ በኋላ የራስዎን እና የልጅዎን እንክብካቤ ለመከታተል ይህን ካርታ ይጠቀሙ!

ለእናት

በእርግዝና ወቅት

- ✓ የሄፕታይቲስ B ደረጃዎን እና የጉበት ሁኔታዎን ለማወቅ በእርግዝናዎ ወቅት ቀደም ብለው የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ለሄፕታይቲስ B እንክብካቤ ያግኙ።
 - አስፈላጊ ከሆነ፣ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ የሄፕታይቲስ B መድሃኒቶችን ማዘዝ ይችላል።

በወሊድ ጊዜ

- ✓ ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ሰራተኞች እርስዎ ሄፕታይቲስ B እንዳሉብዎት ማወቃቸውን ያረጋግጡ።
- ✓ ልጅዎን የሚንከባከበው የጤና እንክብካቤ አቅራቢ እርስዎ ሄፕታይቲስ B እንዳሉብዎት ማወቁን ያረጋግጡ።

ከወሊድ በኋላ እና ቀጥሎ ባሉት ጊዜያት

- ✓ ከ 1- 2 ወራት፣ ለሄፕታይቲስ B እንክብካቤ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይከታተሉ።
 - ይህ በተለይ በእርግዝና ወቅት ህክምና ጀምረው ከነበር አስፈላጊ ነው።
- ✓ ቢያንስ በየ 6 ወሩ ለሄፕታይቲስ B ቁጥጥር የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይከታተሉ።

ለልጅ

በወሊድ ጊዜ

- ከኢንፌክሽን ለመከላከል ልጁ በተወለደ በ 12 ሰዓታት ውስጥ 2 ከትባቶች መውሰድ አለበት፡-
- ✓ አንድ የሄፕታይቲስ B ኢሚዩን ግሎቡሊን (HBIG) ከትባትጥ
 - ✓ የሄፕታይቲስ B ከትባት 1ኛ ከትባት

1-2 ወራት

- ✓ ልጅዎ ለ 2ኛ የሄፕታይቲስ B ከትባት ጊዜው ደርሷል።

6 ወራት

- ✓ ልጅዎ ለ 3ኛ የሄፕታይቲስ B ከትባት ጊዜው ደርሷል።

9-12 ወራት

- ✓ የሄፕታይቲስ B ሁኔታውን ለማወቅ እና የጥበቃ ደረጃውን ለመመዘን ልጅዎ የደም ምርመራ ያስፈልገዋል።

ጡት ማጥባት፡-

- ✓ ልጅዎ ከእርስዎ ደም ጋር የሚኖረውን ንክኪ ለመቀነስ ስለ የጡር ማጥባት ድጋፍ እና እንዴት የተሰነጠቀ ወይም የሚደማ የጡት ጫፍን መከላከል ወይም መቆጣጠር እንደሚችሉ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።
- ✓ በወሊድ ጊዜ አዲሱ ህጻን የሄፕታይቲስ B ከትባት እና የሄፕታይቲስ B ኢሚዩን ግሎቡሊን ከወሰደ፣ በጡት ማጥባት በኩል የሄፕታይቲስ B ከእናት ወደ ልጅ መተላለፍ ዕድል በጣም ዝቅተኛ ነው። ልጅዎ አንድ ጊዜ እነዚህን ከትባቶች ከወሰደ በኋላ፣ ጡት ማጥባት አስተማማኝ ነው።



በእርግዝና ወቅት የትዳር አጋርዎ እና ከእርስዎ ጋር የሚኖሩ መመርመራቸውን እና የሄፕታይቲስ B ከትባት መውሰዳቸውን እርግጠኛ ይሁኑ።

