

Защитите своего ребенка от вирусов, которые могут вызвать рак.

Вакцину против ВПЧ (вируса папилломы человека) можно вводить, начиная с 9 лет. Она защищает детей от видов рака, вызываемых ВПЧ.

Две причины для введения двух доз в возрасте 9 лет

Вакцины против ВПЧ безопасны и формируют лучший иммунитет, если их вводить в раннем возрасте. У детей 9–12 лет вакцины вырабатывают наибольшее количество антител — клеток, которые борются с инфекцией. Вакцина крайне эффективно предотвращает заражение некоторыми видами ВПЧ, если ее ввести человеку до момента заражения.

Когда вашему ребенку исполнится 9 лет, проконсультируйтесь с врачом относительно того, как защитить его от рака с помощью вакцины против ВПЧ. Дополнительную информацию можно получить на сайте <https://www.doh.wa.gov/hrv> (только на английском языке).



Как минимум 35 900 людей в США ежегодно заболевают раком, вызванным ВПЧ.

Два вида рака, которые чаще всего вызывает ВПЧ, — рак шейки матки у женщин и орофарингеальный рак у мужчин.

Большинству детей, которые начали курс вакцинации в возрасте от 9 до 14 лет, требуются ДВЕ дозы вакцины против ВПЧ. Лицам, которые начали курс вакцинации в возрасте от 15 до 26 лет, требуются ТРИ дозы.

