

COVID-19 治療についての 簡単なお案内

COVID-19 治療の種類	接触前の予防薬	モノクローナル抗体薬	経口抗ウイルス薬	点滴型抗ウイルス薬
利用可能な医薬品	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
対象となる人は？	<p>成人と小児患者（少なくとも12歳以上、体重が40キロ以上）で以下にあてはまる方：</p> <ul style="list-style-type: none"> 現時点で SARS-CoV-2 ウイルス（COVID-19）に感染していない 過去数日以内に SARS-CoV-2 ウイルス（COVID-19）感染者との接触はなかった 中程度から重度の免疫不全状態である COVID-19 ワクチンの接種を勧められていない 	<p>成人と小児患者（少なくとも12歳以上、体重が40キロ以上）で以下にあてはまる方：</p> <ul style="list-style-type: none"> COVID-19 の感染で症状が重症化するリスクが高い、例えば入院、死亡など 	<p>Paxlovid:</p> <ul style="list-style-type: none"> 成人および小児患者（12歳以上、体重が40キロ以上） <p>Lagevrio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 成人で COVID-19 の感染で症状が重症化するリスクが高い方、例えば入院、死亡など 成人で他の COVID-19 治療方法を勧められていない方、または、その他の COVID-19 治療を受けることができない方 	<p>成人と小児患者（12歳以上、体重が40キロ以上）で以下にあてはまる方：</p> <ul style="list-style-type: none"> 入院している 入院はしていないが、COVID-19 の感染で症状が重症化するリスクが高い、例えば入院、死亡など <p>小児患者で体重が3.5キロ以上40キロ未満、または小児患者で12歳未満、体重が3.5キロ以上）で以下にあてはまる方：</p> <ul style="list-style-type: none"> 入院している 入院はしていないが、COVID-19 の感染で症状が重症化するリスクが高い、例えば入院、死亡など
治療を受けるタイミングは？	ワクチン接種から2週間後	COVID-19 検査結果が陽性となってから7日以内	COVID-19 検査結果が陽性となってから5日以内	COVID-19 検査結果が陽性となってから7日以内
治療を受ける場所は？	医療提供者	医療提供者	医療提供者、地域の薬局	入院型医療施設

追加情報については hhs.gov をご覧ください



DOH 825-035 May 2022 Japanese

本資料を別の形式で入手したい場合は、1-800-525-0127までお電話ください。耳が不自由な方は、711 (Washington Relay) に電話をするか、civil.rights@doh.wa.gov にメールを送信してください。