

لقاحات كوفيد-19 للأطفال

ما ينبغي أن يعرفه أولياء الأمور/الأوصياء

كيف سيفيد ذلك في المنزل؟

يمكن للقاح كوفيد-19 أن يُحافظ على حماية الأطفال من المرض، وهو ما يعني أن التجمعات في الأماكن المغلقة يمكن استضافتها أو حضورها بأمان أكثر.



سيساعد الحصول على اللقاح في حماية الأطفال وأفراد الأسرة المقيمين في المنزل الواحد.

ينبغي أن تستمر العائلات في اتباع إجراءات السلامة الأخرى الموصى بها لأجل الحماية القصوى.

اللقاح المضاد لكوفيد-19 متاح للأشخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر فأكثر.

لماذا ينبغي أن يتلقى الأطفال اللقاح؟

منذ بداية الجائحة، أصيب أكثر من 15 مليون طفل في الولايات المتحدة بكوفيد-19. بينما تكون الإصابة بكوفيد-19 أخف غالبًا في الأطفال بالمقارنة بالبالغين، فلا يزال ممكناً أن يصاب الأطفال بمرض شديد وينشرونه إلى الأصدقاء والأسرة من ضعاف المناعة أو المهددين بطرق أخرى.

تُعد المتحورات الجديدة من كوفيد-19 هي المسؤولة في الوقت الحالي عن معظم حالات العدوى وحالات الإقامة في المستشفيات لتلقي العلاج في الولايات المتحدة. أثبتت التجارب السريرية أن هذا اللقاح فعال جدًا في الوقاية من كوفيد-19 لدى الشباب. سيكونون أقل عرضة للإصابة بأعراض مرضية شديدة، أو دخول المستشفى، أو الوفاة في حالة الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وتلقي التطعيم هو الطريقة المثلى للحفاظ على صحة أطفالك وسلامتهم.

كيف يحصل طفلي على اللقاح؟

توفر ولاية واشنطن جميع اللقاحات الموصى بها بشكل مجاني للأطفال حتى عمر 18 عامًا. اسأل طبيب أطفالك المعتاد أو العيادة المعتادة التي تذهب إليها إن كان لديهم لقاح كوفيد-19.

يمكن للأسر التي ليس لديها مُقدِّم خدمة رعاية صحية بالفعل الاتصال بخط **Help Me Grow WA** الساخن على الرقم **1-800-322-2588** أو الانتقال إلى الموقع الإلكتروني **ParentHelp123.org** للعثور على مُقدِّم خدمة رعاية صحية، أو عيادة، أو موارد صحية أخرى وتكون هذه الخدمة مجانية، وتتوفر المساعدة في ترجمة اللغات.

يمكنك كذلك زيارة **VaccineLocator.doh.wa.gov** واستخدام الفلتر لترى قائمة بالأماكن القريبة منك حيث يتوفر لقاح الأطفال.

ما عدد الجرعات التي يحتاج الطفل إلى تلقيها؟

- يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 4 سنوات على سلسلة مُكوَّنة من 3 جرعات من لقاح Pfizer، أو سلسلة مُكوَّنة من جرعتين من لقاح Moderna.
- يحصل الأطفال الذين يبلغون من العمر 5 سنوات فأكثر على جرعة واحدة من لقاح Pfizer أو لقاح Moderna.

ينبغي للأطفال الذين يبلغون من العمر 6 أشهر فأكثر، الذين يعانون من ضعف المناعة الحاد أو المتوسط، تلقي سلسلة مُكوَّنة من 3 جرعات، ويمكنهم الحصول على جرعات إضافية بعد مرور شهرين على الأقل من حصولهم على آخر جرعة.

هل يمثل كوفيد-19 خطرًا حقيقيًا على طفلي؟

رغم أن عدد الأطفال الذين أصيبوا بعدوى كوفيد-19 أقل من البالغين، فإن الأطفال يمكن أن:

- يصابوا بعدوى الفيروس المسبب لكوفيد-19
- يمرضوا أو يتوفوا جراء كوفيد-19
- ينشروا كوفيد-19 إلى غيرهم
- يصابوا بمضاعفات خطيرة بسبب كوفيد-19، مثل "الإصابة طويلة الأمد بكوفيد" أو بمرض التهابي خطير يسمى Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C)، المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة)

تبين أن اللقاح له آثار جانبية قليلة جدًا في تلك الفئة، وهو يحميهم بفاعلية جيدة جدًا من المرض. إن فوائد تلقي اللقاح تفوق كثيرًا خطر الإصابة بكوفيد-19.

هل اللقاح آمن لطفلي؟

نعم، يعد اللقاح آمنًا للأطفال. لم تُرصد آثار جانبية خطيرة في التجارب السريرية للقاح على الشباب. الدراسات لا تزال جارية، ولدى الولايات المتحدة نظم سلامة قوي جدًا فيما يخص اللقاحات لرصد أي علامات تحذيرية مبكرًا.

ما الآثار الجانبية الشائعة لتلقي اللقاح في الأطفال؟

تفوق المخاطر الصحية التي يتعرض لها الأطفال عند الإصابة بكوفيد-19 خطر الآثار الجانبية لتلقي اللقاح. تتضمن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا ألم الذراع، وتعبًا، وصداعًا، وألم العضلات، مثل أعراض اللقاحات الروتينية الأخرى. وتكون تلك الأعراض عادةً خفيفة. وتتراوح شدة الآثار الجانبية بصفة عامة من خفيفة إلى معتدلة الشدة، وحدثت خلال يومين من تلقي اللقاح، وزال أغلبها خلال يوم أو يومين.

ما الذي يحتاج الأطفال إلى جلبه معهم عند الحضور إلى موعدهم؟

في معظم الحالات، سيحتاج أولياء الأمور والأوصياء إلى تقديم موافقة على تلقي من تقل أعمارهم عن 18 عامًا للقاح. ينبغي أن يسألوا في موقع اللقاح عما يحتاجونه للموافقة.

لدي المزيد من الأسئلة. أين يمكنني الذهاب؟

اعثر على إجابات لمزيد من الأسئلة عن طريق [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids)، كما يمكنك التحدث مع مقدم الرعاية الصحية المعتاد لطفلك كذلك.