

소아청소년 COVID-19 백신 접종 부모/보호자가 알아야 할 사항

COVID-19 백신은 생후 6개월 이상 누구나 접종할 수 있습니다.

소아청소년은 왜 백신 접종을 받아야 하나요?

팬데믹이 시작된 이후, 미국에서 1,500만 명이 넘는 아동이 COVID-19에 감염되었습니다. COVID-19 증상은 성인보다 아동에게서 경미한 경우가 많지만, 아동 역시 증세가 심해질 수 있으며 면역력이 약하거나 다른 측면에서 취약한 친구와 가족에게 전염시킬 수 있습니다.

새로운 COVID-19 변종은 현재 미국에서 발생하는 대부분의 전염병과 입원의 원인입니다. 임상 시험을 통해 이 백신이 소아청소년의 COVID-19 예방에 매우 효과적이라는 것이 입증되었습니다. 또한 COVID-19으로 인해 심하게 아프거나 입원하거나 사망할 가능성이 훨씬 줄어들게 됩니다.

백신 접종은 자녀를 건강하고 안전하게 보호하는 최선의 방어책입니다.

자녀가 백신 접종을 받으려면 어떻게 해야 하나요?

워싱턴주에서는 18세까지의 청소년에게 모든 권장 백신을 무료로 제공합니다. 담당 소아과 의사 또는 일반 진료소에 COVID-19 백신을 취급하는지 문의하십시오.

의료서비스 제공자가 없는 가족은 **Help Me Grow WA Hotline(1-800-322-2588)**으로 전화하거나 **ParentHelp123.org**를 방문해 의료서비스 제공자, 진료소 또는 그 밖의 의료 자원을 확인하실 수 있습니다. 해당 서비스는 무료이며 통역 서비스가 지원됩니다.

또한 **VaccineLocator.doh.wa.gov**에서 검색 필터를 이용해 소아용 백신을 접종하는 가까운 기관의 목록을 확인하실 수 있습니다.

백신 접종은 가정에 어떤 도움이 되나요?

COVID-19 백신은 아이들을 감염병으로부터 보호해 줄 수 있습니다. 즉, 실내 모임을 더 안전하게 갖거나 이에 참석할 수 있습니다.

백신접종은 아이들이 더 안전하게 지내게 하고 가족을 보호하는 데 도움이 됩니다.



가족들은 최선의 보호를 위해 다른 안전 수칙 권고안을 계속 준수해야 합니다.

소아청소년은 어떤 백신을 접종받아야 하나요?

- 생후 6개월~4세 아동은 Pfizer 시리즈 3회 또는 Moderna 시리즈 2회 접종을 받습니다.
- 5세 이상 아동은 Pfizer 또는 Moderna 백신을 1회 접종받습니다.



중등도 또는 중증 면역저하자인 생후 6개월 이상 아동은 3회 접종을 받아야 하며 마지막 백신 접종 후 최소 2개월 경과 시 추가 접종을 받을 수 있습니다.

문의 사항에 대한 답변 듣기:
온라인 방문: [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids)

전화: 1-833-VAX-HELP(1-833-829-4357), # 누르기
통역 서비스가 지원됩니다.

Vaccinate WA
CovidVaccineWA.org

COVID-19은 실제로 아이들에게 위험한가요?

성인에 비해 COVID-19에 감염된 소아청소년의 수는 적지만 소아청소년은 다음의 가능성이 있습니다.

- COVID-19을 유발하는 바이러스에 감염
- COVID-19으로 인해 아프거나 사망
- 타인에게 COVID-19 전파
- '만성 COVID' 또는 MIS-C라고 하는 위험한 염증성 질환과 같은 COVID-19으로 인한 심각한 합병증 발생

백신은 소아청소년에게서 부작용이 거의 없는 것으로 나타났으며 질병으로부터 보호 효과가 매우 뛰어납니다. 백신 접종이 COVID-19에 걸릴 경우의 위험보다 훨씬 큼니다.

백신은 제 아이에게 안전한가요?

예, 백신은 아동에게 매우 안전한 것으로 여겨집니다. 청소년을 대상으로 한 백신 임상 시험에서 심각한 부작용은 발견되지 않았습니다. 연구가 진행 중이며 미국은 경고 신호를 조기에 포착할 수 있는 매우 강력한 백신 안전 시스템을 갖추고 있습니다.

아동에게 발생하는 백신의 일반적인 부작용은 무엇인가요?

건강상 백신 부작용의 위험보다 아동이 COVID-19에 감염될 경우의 위험이 훨씬 높습니다.

다른 예방 접종과 마찬가지로 팔 통증, 피로감, 두통 및 근육통이 가장 흔하게 발생하는 부작용입니다. 이러한 증상은 일반적으로 경미합니다.

부작용의 심각도는 일반적으로 경증에서 중등도 수준이었으며, 백신 접종 후 2일 이내에 발생하고 대부분은 1-2일 이내에 사라졌습니다.

아동이 접종일에 지참해야 하는 것은 무엇인가요?

대부분의 경우 부모와 보호자는 18세 미만의 소아청소년을 위한 백신 접종 동의서를 제공해야 합니다. 동의를 위해 필요한 사항은 백신 접종 기관에 문의해야 합니다.

추가 질문이 있습니다. 어디에 문의해야 하나요?

[VaccinateWA.org/kids](https://vaccinatewa.org/kids)에서 궁금한 사항에 대한 답변을 찾으실 수 있습니다. 자녀의 의료서비스 제공자에게도 문의하실 수 있습니다.