

# COVID-19 治疗

## 快速指南

COVID-19 的治疗类型	接触前预防	单克隆抗体	口服抗病毒药物	静脉输注抗病毒药物
现有疗法	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
适用于哪些人群?	<p>满足下列条件的成人和儿童患者 (至少年满 12 岁及以上, 且体重至少达到 40 千克):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 目前未感染 SARS-CoV-2 (COVID-19)。</li> <li>• 近期无已知接触 SARS CoV-2 (COVID-19) 感染者。</li> <li>• 免疫力中重度低下。</li> <li>• 不建议接种 COVID-19 疫苗。</li> </ul>	<p>满足下列条件的成人和儿童患者 (至少年满 12 岁及以上, 且体重至少达到 40 千克):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 具有恶化为 COVID-19 重症的较高风险, 包括住院或死亡。</li> </ul>	<p><b>Paxlovid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 成人和儿童患者 (年满 12 岁及以上, 且体重至少达到 40 千克)。</li> </ul> <p><b>Lagevrio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 具有恶化为 COVID-19 重症的较高风险的成人, 包括住院或死亡。</li> <li>• 不建议接受 COVID-19 替代治疗方案或无法获得其他 COVID-19 治疗方案的成人。</li> </ul>	<p>满足下列条件的成人和儿童患者 (至少年满 12 岁及以上, 且体重至少达到 40 千克):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 目前住院</li> <li>• 未住院且无恶化为 COVID-19 重症的高风险, 包括住院或死亡。</li> </ul> <p>满足下列条件且体重为 3.5 千克至 40 千克以下的儿童患者或年龄在 12 岁以下、体重至少为 3.5 千克的儿童患者:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 目前住院</li> <li>• 未住院且无恶化为 COVID-19 重症的高风险, 包括住院或死亡。</li> </ul>
何时接受治疗?	接种疫苗满 2 周后	COVID-19 检测结果呈阳性后 7 天或更短时间内	COVID-19 检测结果呈阳性后 5 天或更短时间内	COVID-19 检测结果呈阳性后 7 天或更短时间内
如何接受治疗?	医疗服务提供者	医疗服务提供者	医疗服务提供者、当地药房	住院医疗机构

如需了解更多信息, 请访问: [hhs.gov](https://hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 Simplified Chinese

若您需要本档的其他格式, 请致电 1-800-525-0127。失聪或听障者客户, 请致电 711 (Washington Relay) 或发送电子邮件至 [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov)。