

د COVID-19 رملنېد

گرندی لارښود

IV Antivirals	Oral Antivirals	Monoclonal انتي باډي	مخکې له مخکې-افشا کېدل مخنیوی	د COVID-19 ډول درملني
VEKLURY (remdesivir)	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	Bebtelovimab	Evusheld	څه شی "موجود دي"
<p>بالغ او د تي خوري ماشومان ناروغان چې (12 عمرې وي او زبات لږ تر لږه 40 وزن لري کلو) څوک:</p> <ul style="list-style-type: none"> • روغتن کې بستر وي • نه وي بستر لور خطر د پېچلي ناروغی لپاره پرمختګ کوي په لور د پېچلي COVID-19 په شمول د روغتن کې بستر کېدا يا مرګ. <p>تي خوري ناروغان تر 3.5 کيلو ګرامه پوري وزن لري له 40 کيلو څخه کم يا د ماشومانو ناروغان لږ د 12 کلونو څخه کم لږ تر لږه 3.5 وزن لري کلو څوک چې:</p> <ul style="list-style-type: none"> • روغتن کې بستر وي • نه وي بستر لور خطر د پېچلي ناروغی لپاره پرمختګ کوي په لور د پېچلي COVID-19 په شمول د روغتن کې بستر کېدا يا مرګ. 	<p>:Paxlovid</p> <ul style="list-style-type: none"> • لويان او د ماشومانو درملنه ناروغان چې (12 د کلونو عمر لرونکي وي او زاړه چې وزن يې لږترلږه 40 کيلو ګرامه وي). <p>:Lagevrio</p> <ul style="list-style-type: none"> • لويان په لوره کچه خطر کې وي د پرمختګ کوي په لور د پېچلي ډول COVID-19، په شمول د روغتن کې بستر کېدا يا مرګ. • لويان څوک چې نه وي وړانديز شوي بدیل د COVID-19 درملني اختيارونه يا ونه لري لاسرسي نورې لري Covid-19 درملني. 	<p>بالغ او د تي خوري ماشومان ناروغان (لږترلږه 12 کلو او زاړه 12 ډولس کلو او زاړه چې وزن يې کم از کم 40 کلو وي) څوک:</p> <ul style="list-style-type: none"> • په لور خطر کې وي پرمختګ کوي په لور د پېچلي COVID-19، په شمول د روغتن کې بستر کېدا يا مرګ. 	<p>بالغ او د تي خوري ماشومان ناروغان (لږترلږه 12 کلو او زاړه 40 کيلو ګرامه وزن لرونکي) څوک:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اوس مهال نه وي اخته شوي په SARS-CoV-2 (COVID-19). • چې په دي وروستيو کې د دې اخته کس سره د افشا شوي نه څوک چې د SARS-CoV-2 د COVID-19 باندې اخته وي. • په اعتدال ډول يا پېچلي ډول کمزوري معافیت سيستم ولري. • سپارښتنه يې نه کيږي چې تر لاسه يې کړي د COVID-19 واکسين. 	<p>دا د څه لپاره دي؟</p>
په 7 ورځو کې يا کمو کې د مثبتې معاینې څخه وروسته د Covid-19 لپاره	په 5 ورځو کې دننه يا د معاینې لږ وروسته لپاره مثبت COVID-19	په 7 ورځو کې دننه يا د معاینې لږ وروسته لپاره مثبت د COVID-19	2 اوني د واکسين کولو څخه وروسته	کله بايد ورته لاس رسي ولرو
د بستر مريض د روغتيا پاملرنه آسانتېاوي	روغتيايي پاملرنه چمتو کونکي، خايي "درملتونونه"	د روغتيا چمتو کونکي	د روغتيا چمتو کونکي	څرنګه بايد لاس رسي وکړو؟

نور معلومات په [hhs.gov](https://www.hhs.gov) کې موندل کيږي



DOH 825-035 May 2022 Pashto

د دي سند په بله بڼه کې غوښتلو لپاره، 1-800-525-0127 ته زنگ ووهئ. کابنه او هغه پيرونکي چې د اورېدو ستونزه لري، مهرباني وکړئ 711 (Washington Relay) ته زنگ ووهئ يا برېښنالیک civil.rights@doh.wa.gov.