



Туляремия

Что такое туляремия?

- Туляремия – это инфекция, вызываемая бактериями *Francisella tularensis*, которой могут заразиться животные и люди. Каждый год в США отмечается около 200 случаев заболевания туляремией среди людей. Большинство случаев заболевания туляремией в США вызвано укусами инфицированных клещей или контактом с заражёнными кроликами. Если бактерии туляремии распространяются намеренно, например, при террористическом акте с использованием бактериологического оружия, бактерии, скорее всего, будут распыляться в воздухе и попадать в организм при вдыхании.

Как распространяется туляремия?

Каковы ее симптомы?

- Вы можете заразиться туляремией при контакте с заражёнными животными, при употреблении заражённой пищи или воды, или при вдыхании заражённой пыли или аэрозоля. Туляремия НЕ передаётся от человека к человеку.
- В зависимости от способа заражения, туляремия может протекать в следующих формах:
 - *Легочная инфекция* – наиболее распространённая форма, вызванная вдыханием бактерий с заражённой пылью или аэрозолями.
 - Увеличение лимфатических узлов на шее и воспаление горла – происходит, как правило, в результате употребления заражённой пищи или воды.
 - Распухшие лимфатические узлы, при наличии или отсутствии кожных язв – может возникнуть после контакта с заражёнными материалами или после укуса заражёнными мухами или клещами.
- Все формы заболевания сопровождаются симптомами, похожими на грипп, такими как повышение температуры, озноб, ломота в теле и слабость; симптомы обычно возникают от трёх до пяти дней день после контакта с бактериями. У людей, болеющих пневмонией, могут возникнуть боли в грудной клетке, затруднение дыхания и дыхательная недостаточность.

Профилактические меры

- Если вы обнаружили у себя эти симптомы – как можно скорее обратитесь к своему лечащему врачу. Если вы считаете, что вас преднамеренно подвергли контакту с бактериями, вы должны незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.
- В случае контакта с туляремией, для предотвращения (профилактики) инфекции может быть назначено лечение антибиотиками. В настоящее время не существует вакцины, предназначенной для всеобщего применения.

Лечение туляремии

- На ранней стадии туляремии очень важно лечение соответствующими антибиотиками. Для лечения или профилактики туляремии антибиотики следует использовать только по указанию лечащего врача или местного отдела здравоохранения.



**WASHINGTON
MILITARY
DEPARTMENT**

Emergency Management Division

ВОЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ШТАТА ВАШИНГТОН

Отдел Чрезвычайных Ситуаций

Camp Murray, WA 98430-5122

Web site: www.emd.wa.gov
253-512-7000; (800) 562-6108



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ШТАТА ВАШИНГТОН**

PO Box 47890
Olympia, WA 98504-7890

Web site: www.doh.wa.gov
360-236-4027; (800) 525-0127