

که چېرې تاسو د B هېټایټ یا ژیری لری او میندواره یاست، څه ډول کولای شئ چې د خپل ماشوم او ځان روغتیا خوندي کړئ

د هېټایټ B یا ژیری یوه جدي ناروغي ده، چې بنيایي ستاسو ماشوم یې د عمر تر پایه پورې ولري. که چېرې تاسو میندواره یاست او د B هېټایټ یا ژیری لری، دا ویروس کولای شي د زیرون پر مهال ستاسو له وینې سره د اړیکې له لارې ستاسو پر ماشوم اغیزه وکړي. د خپل ماشوم له اخته کېدو څخه د مخنیوي او د خپل ځان د روغ ساتلو لپاره، د خپلو روغتیايي خدمتونو له چمتو کونکي سره د مینواری په لومړیو کې وینئ تر څو له دوی سره د B هېټایټ یا ژیری په اړه خبرې وکړئ.

له دې جدول څخه د میندواری پر مهال او له هغې وروسته د خپل ځان او ماشوم د روغتیا د څارنې په موخه کار واخلئ!

د زیرون پر مهال

تجویز کړي

له اخته کېدو څخه د خونديتوب په موخه نوی زیربډلی ماشوم باید له زیرون وروسته د 12 ساعتونو په لړ کې 2 واکسینونه ترلاسه کړي:
• یو واکسین د B هېټایټ یا ژیری د خونديتوب گلوبین (HBIG)
• د B هېټایټ یا ژیری 1 واکسین

له 1-2 میاشتو عمر پر مهال

• ستاسو ماشوم باید د B هېټایټ یا ژیری 2 واکسین ترلاسه کړي.

د 6 میاشتو د عمر پر مهال

• ستاسو ماشوم باید د B هېټایټ یا ژیری 3 واکسین ترلاسه کړي.

له 9-12 میاشتو عمر پر مهال

• ستاسو ماشوم د وینې معاینې ته اړتیا لري تر څو د دوی د B هېټایټ یا ژیری حالت چک شي او د خونديتوب کچه یې و ارزول شي.

د مور د شیدو ور کول

• د خپلو روغتیايي خدمتونو له چمتو کونکو سره د مور د شیدو د ورکولو د ملاتړ او دا چې څه ډول کولای شو د سینو چاوبډلی او یا وینې شویو څوکي په داسې ډول مدیریت کړو چې ستاسو له وینې سره د ماشوم د اړیکې را کمه کړو.
• که چېرې ماشوم د زیرون پر مهال د B هېټایټ یا ژیری واکسین او د B هېټایټ یا ژیری د خونديتوب گلوبولین ترلاسه کړل، د شیدو له لارې له مور څخه ماشوم ته د B هېټایټ یا ژیری د لېږد خطر ډېر کم دی. کله چې ستاسو ماشوم دا واکسین ترلاسه کړي، د مور شیدي ور کول به خطر دی.

د میندواری پر مهال د میندو

لپاره

• د میندواری په لومړیو کې د B هېټایټ یا ژیری ته د پاملرنې په موخه د روغتیايي خدمتونو یوه چمتو کونکي ته مراجعه وکړئ تر څو تر څو خپل د B هېټایټ یا ژیری کچه او د ځیکر فعالیت چک کړئ.
• ستاسو د روغتیايي خدمتونو چمتو کونکي کولای شي د اړتیا په صورت کې د زیرون پر مهال د B هېټایټ یا ژیری درمل.

تجویز کړي

• ډاډ ترلاسه کړئ چې د روغتون کار کونکي پوهیږي چې تاسو د B هېټایټ یا ژیری لری.
• ډاډ ترلاسه کړئ چې د روغتیايي خدمتونو هغه چمتو کونکي چې ستاسو ماشوم ته پاملرنه کوي پوهیږي چې تاسو د B هېټایټ یا ژیری لری.

له زیرون وروسته او له هخوا

• په 1-2 میاشتو کې، د B له هېټایټ یا ژیری څخه د پاملرنې په موخه د خپلو روغتیايي خدمتونو له چمتو کونکي سره تعقیبي ناسته ترسره کړئ.
• دا په ځانگړي توگه هغه وخت ډېر مهم دی که چېرې تاسو د میندواری پر مهال درملنه پیل کړي وي.
• لږ تر لږه په هرو 6 میاشتو کې، د B له هېټایټ یا ژیری د څارنې په موخه د خپلو روغتیايي خدمتونو له چمتو کونکي سره تعقیبي ناسته ترسره کړئ.

ډاډ لاسته راوړئ چې ستاسې د ژوند ملگری او نور هغوی چې تاسې ورسره ژوند کوئ، ستاسو د میندواری پر مهال یې د B هېټایټ یا ژیری معاینه او واکسین کړي دي.



DOH 420-441 October 2022 Pashto

په بل فارمټ کې د دغه سند د غوښتنو لپاره 1-800-525-0127 شمېرې سره اړیکه کې شئ. د کڼو او هغو پېښونکو لپاره چې په اورېدو کې ستونزه لري، مهرباني وکړئ د 711 (Washington Relay) ته زنگ ووهئ یا civil.rights@doh.wa.gov برېښنالیک واستوئ. اخیستل شوي د North East Medical Services څخه، www.nems.org