

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ + ЗАЩИТИТЕ СВОЕГО ПАРТНЕРА

трихомониаз



ФАКТЫ

- Трихомониаз — это заболевание, передающееся половым путем (ЗППП).
- Трихомониазом могут заболеть как мужчины, так и женщины.
- Многие люди, страдающие трихомониазом, не знают об этом. Инфекция часто протекает бессимптомно. У женщин симптомы проявляются чаще, чем у мужчин.
- Вы можете передавать трихомониаз другим людям, не зная об этом.
- Трихомониаз легко поддается лечению.



Centers for Disease
Control and Prevention
National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and
TB Prevention

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ + ЗАЩИТИТЕ СВОЕГО ПАРТНЕРА



КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ТРИХОМОНИАЗОМ?

- Самый надежный способ профилактики трихомониаза — не иметь половых отношений или иметь половые отношения только с тем человеком, кто не инфицирован и имеет половые отношения только с вами.
- Презервативы могут снизить риск заражения трихомониазом при условии их правильного использования во время каждого полового акта.
- Прекратите заниматься сексом и немедленно обратитесь к врачу в следующих случаях:
 - » Вы заметили любые необычные выделения.
 - » Вы ощущаете жжение при мочеиспускании.
- Промывание половых органов, мочеиспускание или спринцевание после полового акта не предотвратят ни одно ЗППП.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ТРИХОМОНИАЗОМ?

- Заразиться трихомониазом можно, если у вас был вагинальный половой акт с человеком, у которого он есть.
- Женщины обычно заражаются инфекцией через влагалище.
- Мужчины обычно заражаются инфекцией через уретру (мочеиспускательный канал).
- Женщины могут заразиться этим заболеванием от инфицированных мужчин или женщин. Мужчины обычно заражаются от инфицированных женщин.



КАКОВЫ СИМПТОМЫ ТРИХОМОНИАЗА?

Многие люди, зараженные трихомониазом, не знают об этом, потому что у них нет симптомов.

ЕСЛИ ВЫ ЖЕНЩИНА

Вы должны обратить внимание на такие симптомы:

- Необычные выделения из влагалища с резким запахом.
- Дискомфорт при мочеиспускании и во время полового акта.
- Раздражение или зуд в области половых органов.

ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА

Большинство мужчин, которые инфицированы трихомониазом, не имеют никаких симптомов заболевания, но они могут заметить следующее:

- раздражение и жжение внутри полового члена;
- выделения из полового члена.



КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ТРИХОМОНИАЗ?

- Врач должен осмотреть вас и провести тест на наличие паразита, вызывающего трихомониаз.
- Это заболевание труднее диагностировать у мужчин, чем у женщин.



КОГДА СЛЕДУЕТ СДАТЬ АНАЛИЗ?

Многие люди, зараженные трихомониазом, не знают об этом, потому что у них нет симптомов.

ЕСЛИ ВЫ ЖЕНЩИНА

Вам следует сдать тест на трихомониаз в указанных ниже случаях.

- У вас есть какие-либо из этих симптомов:
 - » Выделения из влагалища.
 - » Боль во время полового акта.
 - » Боль во время мочеиспускания.
 - » Раздражение или зуд в области половых органов.
- У вашего партнера трихомониаз или симптомы, которые могут указывать на трихомониаз.



ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА

Вы можете быть инфицированы трихомониазом в указанных ниже случаях.

- У вас есть какие-либо из этих симптомов:
 - » Выделения из полового члена.
 - » Чувство жжения внутри полового члена.
- У вашего партнера трихомониаз или симптомы, которые могут указывать на трихомониаз.



МОГУ ЛИ Я СНОВА ЗАРАЗИТЬСЯ ТРИХОМОНИАЗОМ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ?


Да. Вы можете заразиться трихомониазом снова. Вы можете заразиться от полового партнера, который не проходил лечение, или от нового полового партнера.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ПРОЙДУ КУРС ЛЕЧЕНИЯ?

Многие люди, зараженные трихомониазом, не знают об этом, потому что у них нет симптомов.

ЕСЛИ ВЫ ЖЕНЩИНА

- Вы находитесь в группе повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией, если вы занимаетесь незащищенным сексом с ВИЧ-инфицированным партнером.
- У вас больше шансов передать ВИЧ-инфекцию своему партнеру.
- В случае беременности существует повышенная вероятность преждевременных родов. Существует большая вероятность того, что ребенок родится с недостаточным весом (менее 5 фунтов, то есть 2,3 кг, при рождении).



ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА

- Трихомониаз может вызывать инфекции в уретре (мочеиспускательном канале) или предстательной железе.
- Симптомы могут не исчезать.
- Вы можете повторно заразить своего партнера или передать ему трихомониаз.

ЕСЛИ У МЕНЯ ТРИХОМОНИАЗ, ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ МОЕГО ПАРТНЕРА?

- Ваш партнер также может быть инфицирован.
- Обязательно расскажите об этом своим недавним половым партнерам, чтобы они могли начать курс лечения.
- Воздержитесь от интимной близости, пока вы и партнер не пройдете курс лечения и все симптомы не исчезнут (обычно около недели).

КАК ЛЕЧИТЬ ТРИХОМОНИАЗ?

- Трихомониаз можно вылечить антибиотиками.
- Завершите прием всех лекарственных препаратов, чтобы точно знать, что вы выздоровели.
- Не делитесь ни с кем своими лекарственными препаратами. Вам необходимо принять их все.
- Если после курса лечения у вас все еще сохраняются симптомы, снова обратитесь к врачу.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОЕГО ПАРТНЕРА

Если у вас трихомониаз, вам следует сдать анализ на другие ЗППП. Обязательно расскажите об этом своим недавним половым партнерам, чтобы они также могли сдать анализ. Открыто и честно поговорите со своим партнером о трихомониазе и других ЗППП.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Обратитесь к своему врачу.
- Позвоните по телефону 1-800-CDC-INFO.
- Посетите сайт www.cdc.gov/std/trichomonas.



Centers for Disease Control and Prevention
National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and
TB Prevention