

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬ СВОГО ПАРТНЕРА

трихомоніаз



ФАКТИ

- Трихомоніаз – це захворювання, що передається статевим шляхом (ЗПСШ).
- На трихомоніаз можуть захворіти як чоловіки, так і жінки.
- Більшість людей, які мають трихомоніаз, не знають про це. Зазвичай інфекція не має симптомів. Жінки частіше ніж чоловіки схильні до появи симптомів.
- Трихомоніаз можна передати комусь іншому, не здогадуючись про це.
- Трихомоніаз легко піддається лікуванню та виліковується.



**Centers for Disease
Control and Prevention**
National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and
TB Prevention

ЗАХИСТІТЬСЯ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬСЯ СВОГО ПАРТНЕРА



ЯК ЗНИЗИТИ РИЗИК ЗАРАЖЕННЯ ТРИХОМОНІАЗОМ?

- Найнадійніший спосіб запобігти зараженню трихомоніазом – не мати статевих відносин або мати статеві відносини тільки з тими, у кого немає трихомоніазу або хто має статеві відносини тільки з вами.
- Використання презервативів знижує ризик зараження трихомоніазом за умови правильного використання під час кожного статевого акту.
- Припиніть займатися сексом і негайно зверніться до лікаря в таких випадках.
 - » Ви помітили будь-які незвичайні виділення.
 - » Ви відчуваєте печіння під час сечовипускання.
- Миття статевих органів, сечовипускання або спринцювання після статевого акту не запобігають зараженню ЗПСШ.

ЯК МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ ТРИХОМОНІАЗОМ?

- Заразитися трихомоніазом можна під час вагінального статевого акту з кимось, у кого він є.
- Жінки зазвичай заражаються через піхву.
- Чоловіки зазвичай заражаються через уретру (сечовивідний канал).
- Жінки можуть заразитися від інфікованих чоловіків або жінок. Чоловіки зазвичай заражаються тільки від інфікованих жінок.



ЯКІ СИМПТОМИ ТРИХОМОНІАЗУ?

Багато людей, хворих на трихомоніаз, не знають, що він у них є, оскільки не мають жодних симптомів.

ЯКЩО ВИ ЖІНКА

Ви можете звернути увагу на такі симптоми:

- Незвичні виділення із сильним запахом із піхви.
- Дискомфорт при сечовипусканні та під час статевого акту.
- Подразнення або свербіж навколо статевих органів.

ЯКЩО ВИ ЧОЛОВІК

Більшість чоловіків із трихомоніазом не мають жодних симптомів, але ви можете звернути увагу на:

- подразнення або печіння всередині пеніса;
- виділення з пеніса.

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ + ЗАХИСТІТЬ СВОГО ПАРТНЕРА



ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЧИ Є В МЕНЕ ТРИХОМОНІАЗ?

- Лікар повинен оглянути вас і провести аналізи на паразита, який викликає трихомоніаз.
- Захворювання важче діагностувати в чоловіків, ніж у жінок.



КОЛИ ВАРТО ЗРОБИТИ АНАЛІЗ?

Багато людей, хворих на трихомоніаз, не знають, що він у них є, оскільки не мають жодних симптомів.

ЯКЩО ВИ ЖІНКА

Аналіз на трихомоніаз варто робити в наведених випадках.

- У вас є будь-які з таких симптомів:
 - » виділення з піхви;
 - » біль під час статевого акту;
 - » біль під час сечовипускання;
 - » подразнення або свербіж навколо статевих органів.
- У вашого партнера є трихомоніаз або симптоми, які можуть свідчити про його наявність.



ЯКЩО ВИ ЧОЛОВІК

У вас може бути трихомоніаз у наведених випадках.

- У вас є будь-які з таких симптомів:
 - » виділення з пеніса;
 - » печіння всередині пеніса.
- У вашого партнера є трихомоніаз або симптоми, які можуть свідчити про його наявність.



ЧИ МОЖУ Я ЗНОВУ ЗАРАЗИТИСЯ ТРИХОМОНІАЗОМ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ?


Так, ви можете знову заразитися трихомоніазом. Ви можете заразитися від статевого партнера, що не лікувався, або від нового статевого партнера.

ЩО СТАНЕТЬСЯ, ЯКЩО Я НЕ ЛІКУВАТИМУСЬ?

Багато людей, хворих на трихомоніаз, не знають, що він у них є, оскільки не мають жодних симптомів.

ЯКЩО ВИ ЖІНКА

- У вас вищі шанси заразитися ВІЛ-інфекцією під час незахищених статевих актів із ВІЛ-інфікованим партнером.
- У вас вищі шанси передати ВІЛ-інфекцію своєму партнеру.
- Якщо ви вагітні, ви з більшою ймовірністю можете народити передчасно. Ваша дитина, швидше за все, матиме недостатню вагу (менше 5 фунтів (2,3 кг) при народженні).



ЯКЩО ВИ ЧОЛОВІК

- Трихомоніаз може викликати інфекції в уретрі (сечовивідному каналі) або передміхуровій залозі.
- Симптоми можуть не зникати.
- Ви можете повторно інфікувати свого партнера або передати трихомоніаз партнеру.

ЯКЩО В МЕНЕ Є ТРИХОМОНІАЗ, ТО ЩО ЦЕ ЗНАЧИТЬ ДЛЯ МОГО ПАРТНЕРА?

- У вашого партнера також може бути ця інфекція.
- Обов'язково повідомте своїх нещодавніх статевих партнерів, щоб вони також могли пройти лікування.
- Зачекайте, перш ніж знову займатися сексом, поки ви й партнер не пройдете лікування та всі симптоми не зникнуть (зазвичай приблизно тиждень).

ЯК ЛІКУВАТИ ТРИХОМОНІАЗ?

- Трихомоніаз можна вилікувати антибіотиками.
- Прийміть усі ліки, щоб бути впевненими, що ви вилікувалися.
- Не діліться своїми ліками з іншими. Вам потрібні вони всі.
- Якщо після завершення лікування у вас залишилися симптоми, повторно зверніться до лікаря.



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСІХ

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ ТА СВОГО ПАРТНЕРА.

Якщо у вас є трихомоніаз, вам варто зробити аналізи на інші ЗПСШ. Обов'язково повідомте своїх нещодавніх статевих партнерів, щоб вони також могли зробити аналізи. Відкрито й чесно поговоріть зі своїм партнером про трихомоніаз та інші ЗПСШ.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Проконсультуйтеся з лікарем.
- Зателефонуйте за номером 1-800-CDC-INFO.
- Відвідайте вебсайт www.cdc.gov/std/trichomonas.



Centers for Disease Control and Prevention
National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and
TB Prevention