



ស្វែងយល់អំពីជំងឺកញ្ជ្រើល

តើជំងឺកញ្ជ្រើលគឺជាអ្វី?

កញ្ជ្រើលគឺជាជំងឺងាយនឹងឆ្លងខ្លាំងដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកញ្ជ្រើល។ ជំងឺកញ្ជ្រើលចាប់ផ្តើមដោយមានអាការៈគ្រុនក្តៅខ្លាំង ក្អក ហៀរសំបោរ ភ្នែកក្រហម និងហៀរទឹកភ្នែក។ 3 ទៅ 5 ថ្ងៃក្រោយមក ចាប់ផ្តើមមានកន្ទួលលើមុខ និងរាលដាលដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយ។

ក្នុងករណីមួយចំនួន ជំងឺកញ្ជ្រើលអាចបណ្តាលឱ្យចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ហើមខួរក្បាល រលាកសួត និងបាត់បង់ជីវិត។ កុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំដែលមានប្រព័ន្ធភាពសុំខ្សោយ និងមនុស្សមានផ្ទៃពោះប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់បំផុត។

រោគសញ្ញាទូទៅ

គ្រុនក្តៅខ្លាំង



ក្អក



ហៀរសំបោរ



ភ្នែកក្រហម ហៀរទឹកភ្នែក



កន្ទួលពេញខ្លួន



តើកញ្ជ្រើលឆ្លងរាលដាលដោយរបៀបណា?

មនុស្សឈឺអាចចម្លងជំងឺកញ្ជ្រើលតាមរយៈការក្អក កណ្តាស់ ដកដង្ហើម ឬដៃជិតគ្នា។ មនុស្សអាចឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រើល នៅពេលពួកគេស្រូបខ្យល់ដង្ហើមនេះ ឬប្រសិនបើពួកគេមានវីរុសនៅលើដៃ ហើយយកដៃទៅប៉ះមុខ។ វីរុសកញ្ជ្រើលស្ថិតក្នុងខ្យល់បានរហូតដល់ 2 ម៉ោង ដូច្នេះមនុស្សអាចឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រើលបាន សូម្បីក្រោយពេលដែលអ្នកឈឺចាកចេញពីកន្លែងនោះ។

ស្ថិតនៅផ្ទះ ហើយទូរសព្ទទៅគ្រូពេទ្យ

បើអ្នកមានរោគសញ្ញាជំងឺកញ្ជ្រើល សូមទូរសព្ទទៅការិយាល័យគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។ គ្រូពេទ្យនឹងផ្តល់ការណែនាំពិសេសដល់អ្នក ដើម្បីកុំឱ្យចម្លងជំងឺដល់អ្នកផ្សេងទៀត។ ប្រការសំខាន់គឺមិនចម្លងជំងឺកញ្ជ្រើលដល់អ្នកផ្សេងទៀត។ ស្ថិតនៅផ្ទះ បើអ្នកមានផ្ទុកជំងឺកញ្ជ្រើល។ កុំអញ្ជើញភ្ញៀវមកលេង បើអ្នកគ្រុនក្តៅ ឬមានកន្ទួល។

ការពារគ្រួសារអ្នកកុំឱ្យឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រើល

- វ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ជ្រើល ក្រឡាទែន និងស្នូច (MMR) គឺជាជម្រើសការពារខ្លាំងបំផុតទល់នឹងជំងឺកញ្ជ្រើល។
- វ៉ាក់សាំង MMR មានសុវត្ថិភាពជាងការឈឺជំងឺកញ្ជ្រើល។
- កុមារចាក់វ៉ាក់សាំង MMR នៅអាយុ 1 ឆ្នាំ និង 4 ឆ្នាំ។
- មនុស្សនៅតែចាក់វ៉ាក់សាំង MMR បាន ប្រសិនបើពួកគេមិនបានចាក់វាកាលពីកុមារ។
- មនុស្សគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងនៅ 2 សប្តាហ៍ មុនពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសផ្សេង។
- សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតែមានការផ្ទុះជំងឺកញ្ជ្រើល។
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារខ្លួនអ្នក គ្រួសារអ្នក និងសហគមន៍របស់អ្នកកុំឱ្យឆ្លងជំងឺ។
- ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ គិលានុបដ្ឋាក ឬឱសថការីដែលជឿទុកចិត្ត បើអ្នកមានសំណួរផ្សេងៗ។

