



# 공기전파 감염 주의사항

방문자는 출입하기 전에 간호 부서에서 출입 등록을 합니다.

## 방문 제한

### 출입 전 조치:



물이나 소독젤로 손 세척



National Institute for Occupational Safety and Health  
(NIOSH, 국립산업안전보건원) 호흡보호구 착용  
(N95/PAPR/CAPR)

### 기타 요건:



공기전파 감염 격리실에 우선 격리합니다. 각능하다면 문을 닫아둡니다.



환자 전용 장비나 일회용 장비를 사용해야 합니다.  
공유 장비를 세척하고 소독해야 합니다.

예방 조치를 중단하고 병실을 청소한 후 *Environmental Services*(환경 담당 부서)가 제거할 표지

문 바깥쪽에 붙여둡니다. 표지판을 그대로 두고 실내 공기가 순환할 수 있도록 문을 1 시간 동안 닫아둡니다.  
 병실을 최종적으로 청소한 후 Environmental Services(환경 담당 부서) 직원이 표지판을 제거합니다.

### 공기전파 감염 주의사항

**조건에 따른 방문 제한:** 직원은 방문자에게 시설 정책에 따라 적절한 교육과 PPE 를 제공해야 합니다.  
**개인보호장비(PPE)**

아래에 제시된 단계는 모든 PPE 에 적용되며, 표준 예방조치에 따라 다른 PPE 외에 첫 번째 페이지에 명시된 PPE 만 수집합니다.

PPE 착용(착용)	PPE 탈의(탈의)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 손 위생 수행</li> <li>2. 격리 가운 착용, 끈/스트랩 고정</li> <li>3. 호흡보호구 또는 안면 마스크를 제대로 잘 맞게 착용</li> <li>4. 페이스 실드 또는 고글 착용</li> <li>5. 장갑 착용</li> </ol>	<p><b>CAPR/PAPR 을 착용하는 경우 제조업체의 사용 지침에 따라 올바르게 탈의해야 합니다.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 환자 병실에서는 손을 오염시키지 않고 장갑을 벗어야 합니다.</li> <li>2. 가운을 탈의합니다. 끈을 풀거나 일회용 가운의 경우에는 가능하다면 끈을 끊습니다. 한 번에 한쪽 팔씩 빼고 가운을 아래로 당겨 벗습니다. 가운을 벗으면 돌돌 말아서 적절한 용기에 넣습니다. 그러면 병실에서 나가셔도 됩니다.</li> <li>3. 병실에서 나갈 때는 손을 세척해야 합니다(눈에 띄게 더러워졌거나 대변과 접촉했거나 장 접촉 예방조치를 취한 경우에는 비누와 물을 사용해서 세척해야 합니다).</li> <li>4. 페이스 실드/고글을 벗습니다. 오염될 수 있는 눈 보호구 앞부분은 만지지 마십시오.</li> <li>5. 호흡보호구/안면 마스크를 벗고 적절하게 처리합니다. 앞면은 위험할 수 있으니 만지지 마십시오.</li> <li>6. 손을 다시 세척합니다.</li> </ol>

#### 다음과 같은 조건에서 사용 (시설 정책 참조)

- 새로운 질병 또는 감염 예방 부서의 지시
- 폐결핵

#### 환자 배치

- 환자를 개인 병실에 배정합니다. 공기전파 감염 격리실(AIIR) 사용이 권장됩니다. 불가능한 경우에는 시설 지침을 준수합니다.

#### 식기 및 주방도구

- 특별한 주의사항은 없습니다. 주방용품은 식기세척기로 소독합니다.

#### 침구 및 폐기물 관리

- 환자 병실의 침구를 봉지에 넣습니다. 침구를 지나치게 많이 만지거나 털지는 마십시오. 생물학적 위험 폐기물의 경우 카테고리 B 의료 폐기물 지침을 준수해야 합니다.

#### 병실 청소

- 환자가 퇴원한 후 1 시간 동안 또는 AIIR 에 대한 시설 지침에 따라 문을 닫아 두어야 합니다.
- 1 시간 후, 병원 절차에 따라 추가적으로 환자의 사생활 보호를 위한 커튼 교체를 하여 일반적인 청소 절차를 수행할 수 있습니다.

#### 장비 및 비품

- 환자 병실에서는 필요한 장비 및 비품만 사용합니다.
- 가능한 경우 전용 장비나 일회용 장비를 사용해야 합니다.
- 시설 정책에 따라 소독제로 재사용 가능한 장비/환자 병실을 청소하고 소독합니다.

#### 이송

- 환자의 격리 예방조치 상태를 접수 부서에 알립니다.
- 환자는 손을 세척해야 합니다. 환자가 수술용 마스크를 착용하십시오.
- 이송 담당자는 환자 병실을 나가기 전에 PPE 를 탈의하고 손을 세척합니다. 이송 중 직접적인 접촉이 예상되는 경우에는 적절한 PPE 를 착용해야 합니다.
- 이송 차량을 청소하고 소독합니다.

### 시설 정책에 따라 예방조치를 중단하십시오

예방 조치를 중단하고 병실을 청소한 후 Environmental Services( 환경 담당 부서)가 제거할 표지

420-585 April 2024 Korean

본 문서를 다른 형식으로 요청하려면 1-800-525-0127 로 전화하십시오. 청각 장애가 있는 고객은 전화 711(Washington Relay) 또는 이메일 [doh.information@doh.wa.gov](mailto:doh.information@doh.wa.gov) 로 연락하시면 됩니다.