

關於 Johnson & Johnson (Janssen) COVID-19 疫苗供應情況的更新資訊

**Vaccinate
WA**
CovidVaccineWA.org

發生了什麼事？

從 4 月 24 日起，Johnson & Johnson (J&J) COVID-19 疫苗可再次供應。

4 月 23 日，Centers for Disease Control and Prevention (CDC，疾病控制與預防中心) 的一個諮詢小組 (稱為 Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP，免疫實踐諮詢委員會)) 審查了有關接種疫苗後發生的非常罕見狀況的報告的資料。他們投票決定繼續為 18 歲及以上的人群建議接種 J&J 疫苗。

ACIP 和華盛頓州已從 4 月 13 日至 4 月 23 日暫停使用 J&J 疫苗，而聯邦政府對這種極為罕見類型的血塊 (即 [Cerebral Venous Sinus Thrombosis \(CVST，顱內靜脈竇血栓形成\)](#)) 進行了調查。

此事件展示了我們的疫苗安全性監控工作的效力。

這種反應是非常罕見的。

在暫停使用前的兩週內，在華盛頓大約接種了 90,000 劑 J&J 疫苗。在報告的六個病例中，無一例是發生在華盛頓居民中。

- 在 1 百萬人中不到 2 人在接種疫苗後出現了此情況。
- COVID-19 疫苗的防護效益遠遠超過了針對 COVID-19 疾病危險的任何潛在風險。

我是否可以接種 J&J 疫苗？

是的，從 2021 年 4 月 24 日起，如果您年滿 18 歲，您便可接種 J&J 疫苗。

關於接種 J&J 疫苗，我應該知道什麼？

在接種疫苗後約一週至兩週，您應留意自己是否有以下症狀：

- 呼吸急促
- 胸痛
- 腿部腫脹
- 持續的腹痛
- 嚴重或持續的頭痛或視力模糊
- 注射部位周圍的皮膚下方有明顯的瘀傷或細小血點

出現這些症狀的可能性非常小。然而，如果您出現此類任何症狀，請立即尋求醫療護理。

請記住，在接種任何 COVID-19 疫苗後的第一週期間，**出現輕度至中度症狀是正常的**，包括發燒、頭痛、疲勞和關節/肌肉疼痛。這些副作用通常在接種疫苗後的三天內開始出現，並且應僅持續幾天。

我在哪裡可以瞭解更多資訊並獲取有關此情況的更新資訊？

請訪問 www.doh.wa.gov/jjupdate，獲取華盛頓州 Department of Health (衛生部) 提供的更多資訊。

若要查找或安排 COVID-19 疫苗的預約，您可以使用在華盛頓州接種疫苗：COVID-19 疫苗接種地點定位器線上安排工具，網址：vaccinelocator.doh.wa.gov。



DOH 820-162 April 2021 Traditional Chinese

若您需要本文檔的其他格式，請致電 1-800-525-0127。失聰或聽障客戶請致電 711 (Washington Relay) 或傳送電子郵件至 civil.rights@doh.wa.gov。