

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ

ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਨਾਂ COVID-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹਨ।



Johnson & Johnson

ਐਡੋਨੋਵਾਇਰਸ (ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ) ਵੈਕਸੀਨ

Pfizer – BioNTech

Pfizer ਅਤੇ Moderna ਦੇਵੇਂ mRNA ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹਨ

Moderna

Novavax

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ

ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 1 ਖੁਰਾਕ

6 ਮਹੀਨੇ - 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ - 3 ਖੁਰਾਕਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ

6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 2 ਖੁਰਾਕਾਂ, 4-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ

18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 2 ਖੁਰਾਕਾਂ, 3-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ

5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 2 ਖੁਰਾਕਾਂ, 3-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 3 ਖੁਰਾਕਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 2 ਖੁਰਾਕਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 2 ਖੁਰਾਕਾਂ, Johnson & Johnson ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ, ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ mRNA ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ - 3 ਖੁਰਾਕਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ

ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਮੈਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਕਦੋਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ - 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ - 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ - 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

50+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ - ਪਹਿਲੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

	Johnson & Johnson	Pfizer – BioNTech	Moderna	Novavax
ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ?	ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ 74% ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ 85% ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ 100% ਸੁਰੱਖਿਆ	ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ 95% ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ 100% ਸੁਰੱਖਿਆ	ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ 94% ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ 100% ਸੁਰੱਖਿਆ	ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ 90% ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ 100% ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?	ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਟ, ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਸੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।	ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਟ, ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਸੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ RNA ਮੈਸੇਜਰ (mRNA) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।	ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਟ, ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਸੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ RNA ਮੈਸੇਜਰ (mRNA) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।	ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਟ, ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਸੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਾਈਕ ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?	<ul style="list-style-type: none"> 3.3% ਏਸ਼ੀਅਨ 9.5% ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ/ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ 19.4% ਕਾਲੇ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ 45% ਹਿਸਪੈਨਿਕ/ਲਾਤੀਨੀ 0.2% ਹਵਾਈ ਦੇ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 5.6% ਕਈ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ 59% ਗੋਰੇ <p>ਗਲੋਬਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ 41% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4% ਏਸ਼ੀਅਨ 0.6% ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ 10% ਕਾਲੇ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ 26% ਹਿਸਪੈਨਿਕ/ਲਾਤੀਨੀ 0.2% ਹਵਾਈ ਦੇ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 3% ਕਈ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ 82% ਗੋਰੇ <p>ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ 46.2% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ 34.8% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> 5% ਏਸ਼ੀਅਨ 1% ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ 10% ਕਾਲੇ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ 20% ਹਿਸਪੈਨਿਕ/ਲਾਤੀਨੀ 0.2% ਹਵਾਈ ਦੇ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 2.1% "ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ" 79% ਗੋਰੇ <p>ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ 22% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ 4% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 75% ਗੋਰੇ 12% ਕਾਲੇ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ 7% ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ 22% ਹਿਸਪੈਨਿਕ/ਲਾਤੀਨੀ <p>ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ 95% ਭਾਗੀਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਨ - ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ COVID-19 ਜਾਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ</p>