

# کووڈ-19 ویکسینز کی تصویر

کلینکل ٹرائلز سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام دستیاب ویکسینز کووڈ-19 کے انسداد میں انتہائی مؤثر ہیں۔



Johnson & Johnson آڈینوائرس (وائٹل ویکٹر) ویکسین	BioNTech –Pfizer ویکسین mRNA	Moderna ویکسین mRNA	Novavax پروٹین سب یونٹ ویکسین
18 سال سے زائد عمر کے اکثر افراد کے لئے - 1 خوراک	6 ماہ تا 4 سال کے افراد کے لئے - 3 خوراکیں، پہلی (1) کے 3 ہفتے بعد، دوسری (2) کے 8 ہفتے بعد تیسری خوراک بائیوینٹ ہے۔ 5 سال اور زائد عمر کے اکثر افراد کے لئے - 2 خوراکیں، 3 تا 8 ہفتوں کے فاصلے سے	6 ماہ اور زائد عمر کے اکثر افراد کے لئے - 2 خوراکیں، 4 تا 8 ہفتوں کے فاصلے سے	12 سال اور زائد عمر کے اکثر افراد کے لئے - 2 خوراکیں، 3 تا 8 ہفتوں کے فاصلے سے
18 سال اور زائد عمر کے کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد کے لئے - 2 خوراکیں، پہلی خوراک کے کم از کم 4 ہفتے بعد mRNA ویکسین کی ایک خوراک کے بعد Johnson & Johnson کی ایک خوراک	5 سال اور زائد عمر کے کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد کے لئے - 3 خوراکیں، پہلی خوراک کے 3 ہفتے بعد دوسری خوراک، دوسری کے کم از کم 4 ہفتے بعد تیسری خوراک	6 ماہ اور زائد عمر کے کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد کے لئے - 3 خوراکیں، پہلی خوراک کے 4 ہفتے بعد دوسری خوراک، دوسری کے کم از کم 4 ہفتے بعد تیسری خوراک	12 سال سے زائد عمر کے کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد کے لئے - 2 خوراکیں، پہلی خوراک کے 3 ہفتے بعد دوسری خوراک
18 سال یا زائد	6 ماہ یا زائد	6 ماہ یا زائد	12 سال یا زائد
ترمیم کردہ mRNA بوسٹر کی آخری خوراک کے 2 ماہ بعد - 18 سال اور زائد عمر *	ترمیم کردہ mRNA بوسٹر کی آخری خوراک کے 2 ماہ بعد - 5 سال اور زائد عمر *	اپ ڈیٹ شدہ mRNA بوسٹر کی آخری خوراک کے 2 ماہ بعد - 6 ماہ اور اس سے زائد عمر کے افراد *	ترمیم کردہ mRNA بوسٹر کی آخری خوراک کے 2 ماہ بعد - 12 سال اور زائد عمر *
18 سال اور زائد عمر کے تمام افراد ترمیم کردہ Pfizer یا Moderna بوسٹر کے اہل ہیں۔	5 سال کی عمر کا کوئی بھی فرد جس نے Pfizer ویکسین کی بنیادی سیریز لگوا لی ہو وہ Pfizer اپ ڈیٹ شدہ بوسٹر خوراک کے لئے اہل ہے Pfizer سال اور زائد عمر کے تمام افراد ترمیم کردہ بوسٹر کے اہل ہیں۔ Moderna یا	6 ماہ سے لیکر - 4 سال تک کی عمر کا کوئی بھی فرد جس نے Moderna ویکسین کی بنیادی سیریز مکمل کر لی ہو وہ Moderna کی اپ ڈیٹ شدہ بوسٹر خوراک کے لئے اہل ہے 5 سال اور زائد عمر کے تمام افراد ترمیم کردہ Pfizer یا Moderna بوسٹر کے اہل ہیں۔	12 سال اور زائد عمر کے تمام افراد ترمیم کردہ Pfizer یا Moderna بوسٹر کے اہل ہیں۔
* کچھ حالات میں 18 سال اور زائد عمر کے کچھ افراد اپنی پرائمری سیریز مکمل کرنے کے 6 ماہ بعد Novavax بوسٹر کے بھی اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے براہ مہربانی <a href="https://doh.wa.gov/covidbooster">doh.wa.gov/covidbooster</a> ملاحظہ کریں۔			

## Johnson & Johnson

## BioNTech –Pfizer

## Moderna

## Novavax

ہر بیماری کے خلاف **74 فیصد** تحفظ  
شدید بیماریوں کے خلاف **85 فیصد** تحفظ  
ہسپتال میں داخلے اور موت کے خلاف  
**100 فیصد** تحفظ

ہر بیماری کے خلاف **95 فیصد** تحفظ  
موت کے خلاف **100 فیصد** تحفظ

ہر بیماری کے خلاف **94 فیصد** تحفظ  
موت کے خلاف **100 فیصد** تحفظ

ہر بیماری کے خلاف **90 فیصد** تحفظ  
موت کے خلاف **100 فیصد** تحفظ

کلینکل ٹرائلز میں اس ویکسین کی کیا  
افادیت رہی؟

اس ویکسین میں فعال جز ایڈینو وائرس  
کے علاوہ چکنائی، نمکیات اور شکر  
شامل ہیں۔

اس ویکسین میں فعال جز میسنجر RNA  
(mRNA) کے علاوہ چکنائی، نمکیات اور  
شکر شامل ہیں۔

اس ویکسین میں فعال جز میسنجر RNA  
(mRNA) کے علاوہ چکنائی، نمکیات اور  
شکر شامل ہیں۔

اس ویکسین میں اسپائک گلائوکوپروٹین کے  
علاوہ فیٹس، نمکیات اور شکر شامل ہیں۔

اجزاء کیا ہیں؟

- 3.3 فیصد ایشیائی
- 9.5 فیصد امریکی انڈین یا الاسکا کے  
مقامی افراد
- 19.4 فیصد سیاہ فام/افریقی امریکی
- 45 فیصد ہسپانوی/لاطینی
- 0.2 فیصد ہوائی یا دیگر پیسفک  
جزیروں کے مقامی افراد
- 5.6 فیصد کثیر النسلی
- 59 فیصد سفید فام

- 4 فیصد ایشیائی
- 0.6 فیصد امریکی انڈین یا الاسکا کے  
مقامی افراد
- 10 فیصد سیاہ فام/افریقی امریکی
- 26 فیصد ہسپانوی/لاطینی
- 0.2 فیصد ہوائی یا دیگر پیسفک  
جزیروں کے مقامی افراد
- 3 فیصد کثیر النسلی
- 82 فیصد سفید فام

- 5 فیصد ایشیائی
- 1 فیصد امریکی انڈین یا الاسکا کے  
مقامی افراد
- 10 فیصد سیاہ فام/افریقی امریکی
- 20 فیصد ہسپانوی/لاطینی
- 0.2 فیصد ہوائی یا دیگر پیسفک  
جزیروں کے مقامی افراد
- 2.1 فیصد کثیر النسلی
- 79 فیصد سفید فام

- 75 فیصد سفید فام
- 10 فیصد سیاہ فام/افریقی امریکی
- 1 فیصد امریکی انڈین یا الاسکا کے  
مقامی افراد
- 22 فیصد ہسپانوی/لاطینی

کلینکل ٹرائلز میں کون شامل تھا؟

عالمی کلینکل ٹرائلز کے **41 فیصد** شرکاء  
ایک یا زائد دائمی طبی کیفیات کے حامل  
تھے

عالمی کلینکل ٹرائلز کے **46.2 فیصد**  
شرکاء ایک دائمی طبی کیفیت میں مبتلا  
تھے **34.8 فیصد** شرکاء موٹاپے کا شکار  
تھے۔

**22%** عالمی کلینکل ٹرائلز کے **22 فیصد**  
شرکاء ایک شدید خطرے والی طبی کیفیت  
میں مبتلا تھے اور **4 فیصد** دو یا زائد شدید  
خطرے والی طبی کیفیات میں مبتلا تھے

ٹرائلز کے **95 فیصد** ارکان زائد خطرے  
میں مبتلا تھے – **65 سال** سے زائد عمر  
کے وہ افراد جنہیں ایک سے زائد امراض  
لاحق ہیں یا ایسی جگہوں پر کام کرنے  
والے جہاں کووڈ-19 سے اکثر سامنا ہوتا  
ہے یا بہت رش ہوتا ہے