

小儿 COVID-19 疫苗 家长/监护人须知

6 个月及以上的人群均可以接种 COVID-19 疫苗。

儿童为何应接种疫苗？

自疫情开始以来，美国已有超过 1300 万儿童感染了 COVID-19。由于新的 COVID-19 变种病毒的激增，导致青少年因感染 COVID-19 而住院的比率现已达到峰值。

临床试验证明，在预防青少年感染 COVID-19 方面，这款疫苗的效果非常出色。接种疫苗后，会大大降低儿童因 COVID-19 转为重症、住院或死亡的几率。

查看此 [疫苗探讨指南](#)，可了解如何与青少年及其家庭就疫苗进行对话的相关建议。

如何让孩子接种疫苗？

华盛顿州为 18 岁以下的儿童免费提供所有推荐的疫苗。您可询问孩子的儿科医生或普通诊所，能否为儿童接种 COVID-19 疫苗。

没有医疗服务提供者的家庭现在可以拨打 **1-800-322-2588** 致电 **Help Me Grow WA Hotline** 或访问 **ParentHelp123.org** 寻找合适的医疗服务提供者、诊所或其他医疗资源。本服务免费，并且可以提供语言协助服务。

您还可访问 VaccineLocator.doh.wa.gov，通过筛选查找距您最近的小儿疫苗接种地点清单。

接种疫苗对于在家中的儿童有何帮助？

COVID-19 疫苗可保护儿童免于感染新冠肺炎，这意味着在举办室内聚会时，孩子接受托管或看护将更为安全。

接种疫苗将有效帮助孩子保持安全，并保护家中的家庭成员。

家庭应继续遵循建议的其他安全措施，以实现最佳防护效果。



儿童应接种多少剂疫苗？

建议所有儿童至少接种 2 剂疫苗。可能会建议增加剂次，以便考虑接种最新的疫苗。

- 6 个月至 4 岁的儿童接种 3 剂次的 Pfizer 初始系列疫苗或 2 剂次的 Moderna 初始系列疫苗
- 5 至 11 岁的儿童接种 2 剂次的初始系列疫苗
- 12 至 17 岁的儿童接种 2 剂次的初始系列疫苗



接种过 2 剂系列疫苗且为中度或重度免疫功能低下的儿童，应在第 2 次接种疫苗满 28 天后接种额外的初始剂次疫苗，同时所有 5 岁以上的儿童均应接种一剂加强针剂。

将来可能会建议其他群体接种额外针剂疫苗。

如需解答您的疑问：

请访问：VaccinateWA.org/kids

请致电：1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357)，按 #
我们提供语言协助服务。

**Vaccinate
WA**
CovidVaccineWA.org

COVID-19 是否真的会对孩子造成风险？

尽管感染 COVID-19 的儿童比成人少，但儿童可能会：

- 感染导致 COVID-19 的病毒
- 因 COVID-19 导致生病或死亡
- 将 COVID-19 传染给他人
- 因 COVID-19 而发生严重并发症，例如“COVID 长期慢性症状”或危险的炎症性疾病 MIS-C（儿童多系统炎症综合症）

研究表明，疫苗对儿童群体的副作用较小，且可有效保护儿童免受疾病的侵害。接种疫苗的好处远大于感染 COVID-19 所产生的风险。

疫苗对我的孩子是否安全？

是的，目前认为疫苗对儿童非常安全。在对青少年进行的疫苗临床试验中，未发现严重副作用。目前正在开展相关研究，而且美国拥有非常强大的疫苗安全系统，可以及早发现任何警示信号。

儿童接种疫苗会有哪些常见副作用？

如果儿童感染 COVID-19，所产生的健康风险远远高于疫苗副作用所带来的风险。

与其他疫苗一样，最常见的副作用包括手臂酸痛、疲劳、头痛和肌肉疼痛。这些症状通常非常轻微。

根据报告，[在临床试验中](#)（仅英文内容），儿童在接种第二剂后发生副作用的风险要高于接种第一剂后。一般情况下，副作用的严重程度仅为轻度到中度，通常在接种疫苗后两天内出现，大多数副作用的症状会在一到两天内消失。

儿童在赴诊时，需要携带什么？

大多数情况下，18 岁以下者接种疫苗需要获得父母和监护人的同意。父母和监护人应咨询疫苗接种地点，了解需要如何给予同意授权。

诊所可能会要求出示孩子的身份证、保险卡或 Social Security number（社会保险号码），但您无需向他们提供。即使孩子并非美国公民，也可接种疫苗。疫苗接种地点不得询问任何人的移民身份。个人数据将仅用于公共卫生用途。

我还有其他问题。我从何处可找到解答？

请访问 [VaccinateWA.org/kids](https://vaccinatewa.org/kids)，查找更多问题的解答。您还可向孩子的常规医疗保健提供者咨询。