

Vaccins pédiatriques COVID-19

Ce que les parents/tuteurs doivent savoir

Le vaccin contre le COVID-19 est disponible pour les personnes âgées de 6 mois et plus.

Pourquoi les enfants doivent-ils se faire vacciner ?

Depuis le début de la pandémie, plus de 13 millions d'enfants aux États-Unis ont contracté le COVID-19. La recrudescence des cas de COVID-19 due aux nouveaux variants a entraîné un pic d'hospitalisations chez les jeunes.

Les essais cliniques ont prouvé que ce vaccin marche très bien pour prévenir le COVID-19 chez les jeunes. Ils seront beaucoup moins susceptibles de tomber gravement malade, d'être hospitalisé ou de mourir du COVID-19.

Vous trouverez dans le guide [Parler des vaccins](#) des conseils pour aborder le sujet des vaccins avec les jeunes et les familles.

Comment faire vacciner mon enfant ?

L'État de Washington fournit gratuitement tous les vaccins recommandés pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Demandez au pédiatre ou au centre de soins habituel de votre enfant s'ils proposent le vaccin COVID-19.

Les familles n'ayant pas encore de professionnel de santé peuvent appeler la ligne d'assistance **Help Me Grow WA au 1-800-322-2588** ou consulter **ParentHelp123.org** pour trouver un professionnel de santé, une clinique ou d'autres ressources de santé. Ce service est gratuit et disponible en plusieurs langues.

Vous pouvez également vous rendre sur le site **VaccineLocator.doh.wa.gov** et utiliser le filtre pour afficher une liste des lieux proches de chez vous qui proposent le vaccin pédiatrique.

En quoi cela va-t-il aider à la maison ?

Le vaccin COVID-19 peut protéger les enfants contre la maladie, ce qui rend les rassemblements à l'intérieur plus sûrs pour les organisateurs et les participants.

Vacciner les enfants permet de les protéger et de protéger les autres membres du foyer.



Les familles doivent continuer à respecter les autres mesures de sécurité recommandées pour se protéger de la meilleure manière possible.

Combien de doses les enfants doivent-ils recevoir ?

Selon les recommandations, tous les enfants doivent recevoir au moins deux doses. Des doses supplémentaires peuvent être recommandées pour que l'enfant soit considéré à jour de ses vaccins.




- Les enfants âgés de 6 mois à 4 ans reçoivent un schéma vaccinal initial de 3 doses du vaccin Pfizer ou un schéma vaccinal initial de 2 doses du vaccin Moderna.
- Les enfants âgés de 5 à 11 ans reçoivent un schéma vaccinal initial à 2 doses.
- Les enfants âgés de 12 à 17 ans reçoivent un schéma vaccinal initial à 2 doses.

Les enfants qui ont reçu un schéma vaccinal de 2 doses et qui sont modérément ou gravement immunodéprimés doivent recevoir une dose supplémentaire 28 jours après leur 2ème injection, et tous les enfants âgés de 5 ans et plus doivent recevoir une dose de rappel. À l'avenir, l'administration de doses supplémentaires pourrait être recommandée pour d'autres groupes de personnes.



Pour obtenir des réponses à vos questions :

 **Consultez : [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids)**

 **Appelez : 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), appuyez sur #.**

Plusieurs langues sont disponibles.

Vaccinate WA
CovidVaccineWA.org

Le COVID-19 présente-t-il vraiment un risque pour mon enfant ?

Bien que le nombre d'enfants infectés par le COVID-19 soit plus faible que le nombre d'adultes contaminés, les enfants peuvent :

- Être infectés par le virus qui cause le COVID-19
- Tomber malades ou mourir du COVID-19
- Transmettre le COVID-19 à d'autres personnes
- Souffrir de complications graves dues au COVID-19, comme le « COVID long » ou une maladie inflammatoire dangereuse appelée MIS-C.

Le vaccin s'est révélé avoir très peu d'effets secondaires chez les enfants, qu'il protège très bien contre la maladie. Les bénéfices de la vaccination dépassent largement le risque de contracter le COVID-19.

Le vaccin est-il sûr pour mon enfant ?

Oui, le vaccin est considéré comme très sûr pour les enfants. Aucun effet secondaire grave n'a été détecté lors des essais cliniques du vaccin chez les enfants. Les études se poursuivent, et les États-Unis ont mis en place des systèmes de sécurité rigoureux autour de la vaccination pour détecter rapidement tout signe d'alerte.

Quels sont les effets secondaires courants du vaccin chez les enfants ?

Les risques pour la santé des enfants en cas d'infection par le COVID-19 sont beaucoup plus élevés que le risque d'effets secondaires du vaccin.

Comme pour les autres vaccins, les effets secondaires les plus courants sont une douleur au bras, de la fatigue, des maux de tête et des courbatures. Ces symptômes sont généralement légers.

[Dans les essais cliniques](#) (en anglais uniquement), davantage d'enfants ont signalé des effets secondaires après la deuxième dose qu'après la première dose. Les effets secondaires étaient généralement d'intensité légère à modérée et sont apparus dans les deux jours suivant la vaccination, et la plupart ont disparu en un ou deux jours.

Que doivent apporter les enfants lors de leur rendez-vous ?

Dans la plupart des cas, les parents et les tuteurs devront donner leur consentement pour la vaccination d'une personne âgée de moins de 18 ans. Ils doivent demander à leur centre de vaccination de quoi ils ont besoin pour donner leur consentement.

Les centres de vaccination peuvent demander la carte d'identité de l'enfant, une carte d'assurance ou le Social Security Number (numéro de sécurité sociale) de l'enfant, mais vous n'êtes pas obligé de les donner.

Les enfants n'ont pas l'obligation d'être des citoyens américains pour recevoir le vaccin. Les centres de vaccination ne peuvent pas demander le statut d'immigration de quiconque. Les données personnelles ne seront utilisées qu'à des fins de santé publique.

J'ai d'autres questions. Où puis-je aller ?

Vous trouverez des réponses à d'autres questions sur le site [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids). Vous pouvez également en parler au professionnel de santé habituel de votre enfant.