

# COVID-19-Impfstoffe für Kinder

## Was Eltern bzw. Erziehungsberechtigte wissen sollten

**Der COVID-19-Impfstoff steht Menschen ab einem Alter von 6 Monaten zur Verfügung.**

### Warum sollten Kinder geimpft werden?

Seit Beginn der Pandemie haben sich über 15 Millionen Kinder in den Vereinigten Staaten von Amerika mit COVID-19 infiziert. Das Auftauchen neuer COVID-19-Varianten führte zu Spitzenwerten bei den COVID-19-bedingten Krankenhausaufenthalten bei jungen Menschen.

Klinische Studien haben gezeigt, dass diese Impfung bei der Vorbeugung von COVID-19 bei jungen Menschen sehr gut wirkt. Es wird dadurch viel weniger wahrscheinlich, dass sie ernsthaft krank werden, ins Krankenhaus müssen oder an COVID-19 sterben.

In diesem [Leitfaden zum Thema Impfstoffe](#) finden Sie Tipps dafür, wie Sie zum Thema Impfstoffe mit jungen Menschen und Familienangehörigen argumentieren können.

### Wie gehe ich vor, um mein Kind impfen zu lassen?

Der Bundesstaat Washington stellt Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren kostenlos alle empfohlenen Impfungen zur Verfügung. Fragen Sie den Kinderarzt oder die reguläre Klinik Ihres Kindes, ob sie COVID-19-Impfstoff haben.

Familien, die noch keinen Gesundheitsversorger haben, können die **Help Me Grow WA Hotline unter 1-800-322-2588** anrufen oder zu **ParentHelp123.org** gehen, um einen Arzt, eine Klinik oder andere Gesundheitsressourcen zu finden. Diese Dienstleistung ist kostenlos und Sprachunterstützung steht zur Verfügung.

Sie können auch **VaccineLocator.doh.wa.gov** besuchen und den Filter verwenden, um sich eine Liste von Orten in Ihrer Nähe anzeigen zu lassen, die den Impfstoff für Kinder haben.

### Inwiefern kann dies zu Hause hilfreich sein?

Die Impfung gegen COVID-19 kann Kinder vor der Krankheit schützen. Das bedeutet, dass Treffen in Innenräumen sicherer durchgeführt bzw. besucht werden können.

Eine Impfung hilft Kindern, weiterhin sicher zu sein und die im Haushalt lebenden Familienmitglieder zu schützen.




Für einen bestmöglichen Schutz sollten Familien weiterhin die anderen empfohlene Sicherheitsmaßnahmen befolgen.

### Wie viele Impfdosen benötigen Kinder?

Es wird empfohlen, dass alle Kinder mindestens zwei Dosen erhalten. Möglicherweise werden weitere Dosen empfohlen, um mit der Impfung auf dem aktuellen Stand zu sein.

- Kinder im Alter von **6 Monaten bis 4 Jahren** erhalten eine aus 3 Dosen bestehende Pfizer- oder eine aus 2 Dosen bestehende Moderna-Grundimmunisierung.
- Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erhalten eine aus 2 Dosen bestehende Grundimmunisierung.
- Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren erhalten eine aus 2 Dosen bestehende Grundimmunisierung.

Kinder, die 2 Impfstoffdosen erhalten haben und mäßig oder schwer immungeschwächt sind, sollten 28 Tage nach der 2. Impfung eine zusätzliche Primärdosis erhalten, und alle Kinder ab 5 Jahren sollten eine Auffrischungsdosis erhalten. Möglicherweise werden in Zukunft noch zusätzliche Dosen für andere Gruppen empfohlen.



#### Für Antworten auf Ihre Fragen:



Besuchen Sie: [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids)



Rufen Sie an unter: **1-833-VAX-HELP** (1-833-829-4357), Drücken Sie die Taste #

Sprachunterstützung steht zur Verfügung.

### Ist COVID-19 wirklich ein Risiko für mein Kind?

Obwohl sich im Vergleich zu Erwachsenen weniger Kinder mit COVID-19 infiziert haben, können Kinder:

- sich mit dem Virus infizieren, das COVID-19 hervorruft
- an COVID-19 erkranken oder daran sterben
- COVID-19 auf andere übertragen
- schwere Komplikationen durch COVID-19 bekommen, wie „Long Covid“ oder eine gefährliche entzündliche Krankheit namens MIS-C

Es hat sich gezeigt, dass der Impfstoff bei dieser Bevölkerungsgruppe nur sehr wenige Nebenwirkungen hat und diese sehr gut vor der Krankheit schützt. Die Vorteile einer Impfung überwiegen bei weitem das Risiko, an COVID-19 zu erkranken.

### Ist der Impfstoff für mein Kind sicher?

Ja, der Impfstoff wird als sehr sicher für Kinder angesehen. In klinischen Studien des Impfstoffes an Jugendlichen wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen festgestellt. Die Studien laufen noch, und in den USA bestehen sehr strenge Impfstoffsicherheitssysteme, um Warnsignale frühzeitig zu erkennen.

### Was sind die üblichen Nebenwirkungen der Impfung bei Kindern?

Die Gesundheitsrisiken, wenn Kinder sich mit COVID-19 infizieren, sind viel höher als das Risiko von Impfnebenwirkungen.

Wie auch bei anderen Impfungen sind die häufigsten Nebenwirkungen Schmerzen im Arm, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. Diese Symptome sind in der Regel leicht.

[In klinischen Studien](#) (nur auf Englisch) berichteten mehr Kinder nach der zweiten Dosis Nebenwirkungen als nach der ersten Dosis. Die Nebenwirkungen waren im Allgemeinen leicht bis mittelschwer und traten innerhalb von zwei Tagen nach der Impfung auf, und die meisten verschwanden innerhalb von ein bis zwei Tagen.

### Was müssen die Kinder zu ihrem Termin mitbringen?

In den meisten Fällen müssen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Ihr Einverständnis für die Impfung von Personen unter 18 Jahren geben. Sie sollten bei der Impfstelle fragen, was für die Zustimmung benötigt wird.

Die Kliniken fragen möglicherweise nach dem Ausweis des Kindes, einer Versicherungskarte oder der Social Security Number (Sozialversicherungsnummer), aber Sie müssen diese nicht angeben.

Die Kinder müssen keine US-Bürger sein, um die Impfung zu erhalten. Die Impfstellen dürfen nicht nach dem Einwanderungsstatus fragen. Personenbezogene Daten werden nur für Zwecke der öffentlichen Gesundheit verwendet.

### Ich habe noch Fragen. An wen kann ich mich wenden?

Antworten zu weiteren Fragen finden Sie unter [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids). Sie können auch mit dem Arzt sprechen, der Ihr Kind üblicherweise behandelt.