

ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຄວນຮູ້

ມີຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປແລ້ວ.

ຍ້ອນຫຍັງລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄວນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ?

ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນມາ, ມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍ ກ່ວາ 13 ລ້ານຄົນໃນສະຫະລັດຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19. ພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນ ໃໝ່ໄດ້ແຜ່ກະຈາຍຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄົນເຂົ້າອນປົນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໂຮງໝໍທະນະດຸຖຶງຂຶດສູງສຸດໃນບັນດາ ໄວໜຸ່ມ.

ການທົດລອງທາງດ້ານຄລິນິກໄດ້ຜິສຸດວ່າ ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນໄວໜຸ່ມໄດ້ຕີຫຼາຍ. ພວກເຂົາຈະມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ອາດຈະເຈັບປ່ວຍຫນັກ, ໄດ້ນອນໂຮງໝໍ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ໃຫ້ກວດສອບຂໍ້ມູນນີ້ໃນ [ຄູ່ມືແນະນຳການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄູ່ມືວັກຊີນ](#) ສໍາລັບຄຳແນະນຳວິທີ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບວັກຊີນກັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄອບຄົວ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະພາລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປສັກຢາວັກຊີນໄດ້ແນວໃດ?

ລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ສະໜອງວັກຊີນທີ່ແນະນຳທັງໝົດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ໂດຍ ບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຖາມແພດຂອງເດັກ ຫຼື ຄລິນິກປະຈຳຂອງລູກຂອງທ່ານວ່າ ພວກເຂົາມີຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼື ບໍ່.

ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສາມາດໂທຫາສາຍ Help Me Grow WA Hotline ໄດ້ທີ່ຕີ 1-800-322-2588 ຫຼື ໄປທີ່ ParentHelp123.org ເພື່ອຄົ້ນຫາ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ຄລິນິກ, ຫຼື ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບອື່ນໆ. ບໍລິການນີ້ ແມ່ນບໍ່ເສຍ ຄ່າ ແລະ ມີບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ.

ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ [VaccineLocator.doh.wa.gov](#) ແລະ ໃຊ້ຕົວກຳນົດຕອງເພື່ອເບິ່ງລາຍຊື່ສະຖານທີ່ໃກ້ກັບທ່ານທີ່ມີຢາວັກຊີນສໍາລັບເດັກ.

ນີ້ຈະຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດຢູ່ເຮືອນ?

ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສາມາດປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍ ຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດໄດ້, ໝາຍຄວາມວ່າການລຸມນຸມພາຍໃນເຮືອນ ສາມາດປອດໄພກວ່າໃນການເປັນເຈົ້າພາບ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການສັກວັກຊີນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ປົກປ້ອງສະມາຊິກຄອບຄົວໃນ ຄົວເຮືອນ.


ບັນດາຄອບຄົວຄວນສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວາມປອດໄພອື່ນໆທີ່ແນະນຳສໍາລັບການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ.




ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນປະເພດໃດ?

ຢາກແນະນຳໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຮັບການສັກຢາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເຂັ້ມ. ອາດຈະແນະນຳໃຫ້ຮັບການສັກເຂັ້ມເພີ່ມເພື່ອໃຫ້ມີພູມຄຸ້ມກັນຢ່າງສະເໝີ.

- ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 6 ເດືອນ - 4 ປີ ຈະໄດ້ຮັບ Pfizer 3 ເຂັ້ມສັກເປັນເຂັ້ມຫຼັກ ຫຼື Moderna 2 ເຂັ້ມສັກເປັນ ເຂັ້ມຫຼັກ
- ເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີອາຍຸ 5-11 ປີ ຈະໄດ້ຮັບຢາ 2 ເຂັ້ມເປັນເຂັ້ມຫຼັກ
- ເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີອາຍຸ 12-17 ປີ ຈະໄດ້ຮັບຢາ 2 ເຂັ້ມເປັນເຂັ້ມຫຼັກ



ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຢາ 2 ເຂັ້ມເປັນເຂັ້ມຫຼັກ ແລະ ມີພູມຄຸ້ມກັນປົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸ່ນແຮງຄວນຈະຮັບການສັກຢາ ເຂັ້ມຫຼັກເພີ່ມເຕີມ ເວລາ 28 ມື້ ຫຼັງຈາກເຂັ້ມທີ່ 2 ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນໄປ ຄວນຈະຮັບການ ສັກຢາເຂັ້ມກະຕຸ້ນ. ອາດຈະແນະນຳສິດຢາເຂັ້ມເພີ່ມໃຫ້ເດັກກຸ່ມອື່ນໃນອະນາຄົດ.



ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແທ້ບໍ່?

ເຖິງແມ່ນວ່າ ເດັກນ້ອຍຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ກໍຕາມ, ແຕ່ເດັກນ້ອຍກໍສາມາດ:

- ຕິດເຊື້ອໄວຣັດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19
- ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19
- ແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄປສູ່ຜູ້ອື່ນ
- ໄດ້ຮັບອາການແລກຊ້ອນຮ້າຍແຮງຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ເຊັ່ນວ່າ: “ມີພະຍາດ ໂຄວິດ ເປັນເວລາຍາວນານ” ຫຼື ພະຍາດອັກເສບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ MIS-C

ຢາວັກຊີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍຫຼາຍໃນບະຊາກອນນີ້ ແລະ ມັນປົກປ້ອງພວກເຂົາໄດ້ຕີຫຼາຍຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງການສັກຢາວັກຊີນມີຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ຢາວັກຊີນມີຄວາມປອດໄພສຳລັບລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນບໍ່?

ແມ່ນ, ຢາວັກຊີນຖືວ່າມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍ ສຳລັບບໍ່ພົບຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃນການທົດລອງທາງຄວິດຂອງວັກຊີນ ໃນໄວໜຸ່ມ. ບັນດາການສຶກສາ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ແລະ ສະຫະລັດມີລະບົບຄວາມປອດໄພ ຂອງຢາວັກຊີນທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຈັບສັນຍານເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ.

ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບຂອງຢາວັກຊີນ ໃນເດັກນ້ອຍມີຫຍັງແດ່?

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19ແມ່ນສູງກວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາວັກຊີນ.

ຄືກັນກັບຢາວັກຊີນອື່ນໆ, ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບລວມມີອາການເຈັບແຂນ, ອິດເມື່ອຍ, ປວດຫົວ ແລະ ເຈັບກ້າມ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະບໍ່ຮຸນແຮງ.

[ໃນການທົດລອງທາງດ້ານຄວິດ](#) (ພາສາ ອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ມີເດັກນ້ອຍລາຍງານຜົນຂ້າງຄຽງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເຂັ້ມທົ່ວຫຼາຍກວ່າຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເຂັ້ມທຳອິດ. ຜົນຂ້າງຄຽງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີຄວາມຮຸນແຮງແລ້ວກັບອາການເຖິງບານກາງ ແລະ ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສອງມື້ຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຫາຍໄປພາຍໃນໜຶ່ງຫາສອງມື້.

ເດັກນ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງກະກຽມຫຍັງໄປໃນການນັດໝາຍຂອງພວກເຂົາ?

ໃນກໍລະນີສ່ວນຫຼາຍ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຈະຕ້ອງໃຫ້ການຍິນຍອມ ໃນການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ພວກເຂົາຄວນຖາມສະຖານທີ່ສັກຢາວັກຊີນວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການການຍິນຍອມ ຫຼື ບໍ່.

ບັນດາຄວິດອາດຈະຂໍຂະຫັດຂອງເດັກ, ບັດປະກັນໄພ, ຫຼື Social Security number (ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ), ແຕ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາ:

ເດັກນ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຜົນລະເມືອງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເພື່ອສັກຢາວັກຊີນ. ສະຖານທີ່ສັກຢາວັກຊີນຈະບໍ່ສາມາດຖາມຫາສະຖານະພາບການເຂົ້າເມືອງໃດໆ. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານສາທາລະນະສຸກເທົ່ານັ້ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄປບ່ອນໃດ?

ຊອກຫາຄຳຕອບ ສຳລັບຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids). ທ່ານຍັງສາມາດລົມກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບປະຈຳຂອງລູກຂອງທ່ານໄດ້.