

Vacinas pediátricas contra a COVID-19

O que os pais/responsáveis devem saber

A vacina contra a COVID-19 está disponível para pessoas com 6 meses de idade ou mais.

Por que as crianças devem ser vacinadas?

Desde o início da pandemia, mais de 13 milhões de crianças nos Estados Unidos foram infectadas pela COVID-19, e os novos surtos causados pelas variantes do vírus acabaram gerando um pico de internações entre os jovens.

Os ensaios clínicos provaram que esta vacina funciona muito bem na prevenção da COVID-19 em jovens. A probabilidade de ficarem gravemente doentes, serem internados ou falecerem devido à COVID-19 será muito menor.

Confira o [guia "Conversando sobre vacinas"](#) (apenas em inglês) para saber mais sobre como abordar este assunto com os jovens e os familiares.

Como faço para vacinar meu filho?

O estado de Washington fornece de forma gratuita todas as vacinas recomendadas para jovens de até 18 anos de idade. Pergunte ao pediatra ou à clínica que atende o seu filho se a vacina contra a COVID-19 está disponível.

As famílias que ainda não têm um provedor de assistência médica podem ligar para a **linha direta Help Me Grow do estado de Washington no número 1-800-322-2588** ou acessar ParentHelp123.org para buscar um provedor, uma clínica ou para saber sobre outros recursos de saúde. Este serviço é gratuito e oferece atendimento disponível em vários idiomas.

Você também pode acessar VaccineLocator.doh.wa.gov e, com o auxílio do filtro, verificar uma lista de locais próximos a você que disponibilizam a vacina pediátrica.

Como isso pode ajudar em casa?

A vacina contra a COVID-19 pode manter as crianças protegidas da doença, o que significa que pode ser mais seguro realizar ou comparecer a eventos em locais fechados.

A vacinação é importante, pois ajuda a manter as crianças seguras e a proteger os membros da família ou da residência.



As famílias devem continuar seguindo outras medidas de segurança recomendadas para obter maior proteção.

Quantas doses as crianças devem receber?

Recomenda-se que todas as crianças recebam pelo menos duas doses. Para que a vacinação seja considerada atualizada, doses adicionais podem ser recomendadas.



- Crianças de **6 meses a 4 anos** de idade recebem uma série primária de 3 doses da Pfizer ou uma série primária de 2 doses da Moderna
- Crianças entre **5 e 11 anos** de idade recebem uma série primária de 2 doses
- Crianças entre **12 e 17 anos** de idade recebem uma série primária de 2 doses
- Crianças que receberam a série de 2 doses que tenham um grau de imunossupressão moderado ou grave devem receber uma dose primária adicional 28 dias após a segunda dose, além disso, todas as crianças que tenham mais de 5 anos devem receber uma dose de reforço. Doses adicionais podem ser recomendadas para outros grupos no futuro.



Para saber mais informações:



Acesse: VaccinateWA.org/kids



Ligue: **1-833-VAX-HELP** (1-833-829-4357), pressione #

O atendimento está disponível em vários idiomas.

**Vaccinate
WA** 
CovidVaccineWA.org

A COVID-19 é realmente um risco para o meu filho?

Embora menos crianças tenham sido infectadas com a COVID-19 em comparação aos adultos, as crianças podem:

- Ser infectadas com o vírus que causa a COVID-19;
- Desenvolver a doença ou falecer devido à COVID-19;
- Transmitir a COVID-19 para outras pessoas;
- Apresentar complicações graves advindas da COVID-19, como a "COVID longa" ou uma doença inflamatória perigosa chamada MIS-C.

A vacina demonstrou ter poucos efeitos colaterais nessa população e alta proteção contra a doença. Os benefícios da vacinação superam o risco de contrair a COVID-19.

A vacina é segura para o meu filho?

Sim, a vacina é considerada muito segura para crianças. Nenhum efeito colateral grave foi detectado nos ensaios clínicos da vacina em jovens. Os EUA e os estudos em andamento contam com sistemas de segurança altamente eficazes para as vacinas de modo a detectar quaisquer sinais de alerta com antecedência.

Quais são os efeitos colaterais comuns da vacina em crianças?

Os riscos para a saúde de crianças infectadas com a COVID-19 são muito maiores comparando-se ao risco dos efeitos colaterais da vacina.

Como em qualquer outra vacina, entre os efeitos colaterais mais comuns estão: dor no braço, cansaço, dor de cabeça e dores musculares. Esses sintomas geralmente são leves.

[Nos ensaios clínicos](#) (apenas em inglês), a maioria das crianças relatou efeitos colaterais após a segunda dose em comparação com a primeira. Os efeitos colaterais foram geralmente leves a moderados em relação à gravidade e ocorreram dentro de dois dias após a vacinação, além disso, a maioria dos sintomas desapareceu dentro de um a dois dias.

O que é necessário para as crianças serem vacinadas?

Na maioria dos casos, os pais e responsáveis precisarão consentir a vacinação aos seus filhos menores de 18 anos. Eles devem solicitar informação no local de vacinação sobre o que precisam para realizar o consentimento.

As clínicas podem solicitar a identidade da criança, um cartão de seguro ou o Social Security number (número do seguro social), mas não é necessário fornecê-los.

As crianças não precisam ser cidadãs americanas para receber a vacina. Os locais de vacinação não podem solicitar o status de imigração de ninguém. Dados pessoais serão usados somente para fins de saúde pública.

Tenho outras dúvidas. Onde posso obter mais informações?

Encontre respostas para outras dúvidas em [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids). Fale também com o médico responsável pelo seu filho.