

# Vacunas pediátricas contra el COVID-19

## Lo que deberían saber los padres y tutores

**La vacunación contra el COVID-19 ya está autorizada para los niños mayores de 6 meses.**

### ¿Por qué deberían vacunarse los niños?

Desde el comienzo de la pandemia, cerca de 15 millones de niños en Estados Unidos contrajeron COVID-19. Los nuevos aumentos repentinos de variantes de COVID-19 han llevado a un pico de hospitalizaciones por COVID-19 entre los jóvenes.

Los ensayos clínicos demostraron que esta vacuna funciona muy bien en la prevención de enfermedades graves y hospitalizaciones por COVID-19 en los jóvenes. Ahora que la elegibilidad ha aumentado a todos esos 6 meses en adelante, la protección de la comunidad será más fuerte.

Consulte esta guía [Talking about Vaccines](#) (solo en inglés) para obtener consejos sobre cómo tener una conversación sobre las vacunas con los jóvenes y las familias.

### ¿Cómo vacuno a mi hijo?

El estado de Washington proporciona todas las vacunas recomendadas sin costo para niños hasta los 18 años. Pregúntele al médico clínico o pediatra habitual de su hijo si aplica la vacuna contra el COVID-19.

Las familias que aún no tienen un proveedor de atención médica pueden llamar a la línea directa de Help Me Grow WA al 1-800-322-2588 o visitar [ParentHelp123.org](#) para encontrar un proveedor de atención médica, una clínica u otros recursos de salud. Este servicio es gratuito y hay disponible asistencia con el idioma.

También puede visitar [VaccineLocator.doh.wa.gov](#) y usar el filtro para ver una lista de los lugares cercanos a usted que tengan la vacuna pediátrica.

### ¿Cómo ayudará esto en casa?

La vacuna contra el COVID-19 puede proteger a los niños de la enfermedad, lo que significa que puede ser más seguro participar en reuniones en espacios cerrados.

Vacunarse ayudara a los niños a estar más seguros y proteger a la familia miembros en el Familiar.



Las familias deberían seguir respetando otras medidas de seguridad recomendadas para tener la mejor protección.

### ¿Qué vacuna deberían recibir los niños?

Se recomienda que todos los niños reciban al menos la serie primaria.

- Los niños de **6 meses a 4 años** reciben una serie primaria de 3 dosis de Pfizer o una serie primaria de 2 dosis de Moderna.
- Los niños de **5 a 11 años** reciben una serie primaria de 2 dosis.
- Los niños de **12 a 17 años** reciben una serie primaria de 2 dosis. .



Los niños que recibieron una serie de 2 dosis y están moderada o gravemente inmunocomprometidos deben recibir una dosis primaria adicional y todos los niños de 6 meses en adelante que completaron una serie primaria de 2 dosis deben recibir una dosis de refuerzo.

**Para obtener respuestas a sus preguntas:**

 Visite [VaccinateWA.org/kids](#)

 Llame al **1-833-VAX-HELP** (1-833-829-4357) y presione #

Se ofrece asistencia lingüística.

**Vacúnate  
WA** 

[VacunaDeCovidWA.org](#)

## ¿Es el COVID-19 realmente un riesgo para mi hijo?

Aunque menos niños y adolescentes se infectaron con la COVID-19 en comparación con los adultos, lo siguiente es posible en niños:

- que se infecten con el virus que provoca el COVID-19;
- que se enfermen o mueran de COVID-19;
- que propaguen el COVID-19 a otros;
- que tengan complicaciones graves de el COVID-19, como “COVID larga” o una enfermedad inflamatoria peligrosa llamada MIS-C (por su sigla en inglés, síndrome inflamatorio multisistémico en niños).

Se demostró que la vacuna tiene muy pocos efectos secundarios en esta población y que protege muy bien a los niños de la enfermedad. Los beneficios de la vacunación superan con creces los riesgos de contraer COVID-19.

## ¿La vacuna es segura para mi hijo?

Sí, se considera que la vacuna es muy segura para los niños. No se detectaron efectos secundarios graves en los ensayos clínicos de la vacuna en niños. Hay estudios en curso y EE. UU. cuenta con sistemas de seguridad de vacunas muy robustos para detectar tempranamente cualquier advertencia.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de la vacuna en los niños?

Los riesgos de salud para un niño infectado con COVID-19 son mucho más altos que el riesgo de los efectos secundarios de la vacuna.

Como otras vacunas, los efectos secundarios más frecuentes son dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza y dolor muscular. Estos síntomas suelen ser leves.

[En los ensayos clínicos](#), más niños informaron efectos secundarios después de la segunda dosis que de la primera dosis. En general, los síntomas fueron de leves a moderados, se produjeron dentro de los dos días posteriores a la vacunación y desaparecieron en uno o dos días.

## ¿Qué deben llevar los niños a su cita?

En la mayoría de los casos, los padres y los tutores tendrán que brindar su consentimiento para vacunar a alguien menor de 18 años. Deberían preguntarle al centro de vacunación qué necesitan para el consentimiento.

Es posible que las clínicas le pidan la identificación del niño, una tarjeta del seguro o el número del Seguro Social, pero no es necesario que los brinde.

No es necesario que los niños sean ciudadanos de EE. UU. para colocarse la vacuna. Los centros de vacunación no pueden preguntar por el estatus migratorio de nadie. Los datos personales solo se utilizarán con fines de salud pública.

## Tengo más preguntas. ¿A dónde puedo ir?

Puede consultar las respuestas a más preguntas en [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids). También puede hablar con el proveedor de atención médica habitual de su hijo.