

# Vắc-xin ngừa COVID-19 Cho Trẻ Em

## Những điều cha mẹ/người giám hộ cần biết

Vắc-xin COVID-19 dành cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên.

### Tại sao trẻ nên tiêm vắc-xin?

Từ khi bắt đầu dịch bệnh, hơn 15 triệu trẻ em tại Hoa Kỳ đã nhiễm COVID-19. Biến thể COVID-19 mới nổi lên khiến các ca nhập viện do COVID-19 ở thanh niên đạt đỉnh điểm.

Các thử nghiệm lâm sàng chứng minh rằng vắc-xin này rất có hiệu quả trong việc phòng ngừa COVID-19 ở thanh niên. Trẻ sẽ có ít khả năng bị ốm nghiêm trọng, nằm viện hoặc tử vong vì COVID-19 nhất.

Xem [hướng dẫn Trò Chuyện về Vắc-xin](#) này để biết những lời khuyên khi trò chuyện về vắc-xin với thanh niên và gia đình.

### Làm thế nào để tôi cho trẻ tiêm vắc-xin?

Tiểu Bang Washington cung cấp miễn phí mọi vắc-xin được khuyến cáo cho trẻ em đến năm 18 tuổi. Hãy hỏi bác sĩ nhi khoa của quý vị hoặc phòng khám thông thường xem họ có vắc-xin COVID-19 không.

Những gia đình không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể gọi đến **Help Me Grow WA Hotline theo số 1-800-322-2588** hoặc vào **ParentHelp123.org** để tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng khám hoặc nguồn hỗ trợ sức khỏe khác. Dịch vụ này là miễn phí và có hỗ trợ ngôn ngữ.

Quý vị cũng có thể truy cập trang **VaccineLocator.doh.wa.gov** và sử dụng bộ lọc để xem danh sách các địa điểm gần chỗ của quý vị có vắc-xin cho trẻ em.

### Điều này sẽ giúp ích như thế nào ở nhà?

Vắc-xin COVID-19 có thể giúp bảo vệ trẻ khỏi mắc bệnh, nghĩa là có thể tổ chức hoặc tham dự những buổi tụ tập trong nhà an toàn hơn.

Việc tiêm vắc-xin giúp trẻ em an toàn hơn và bảo vệ các thành viên gia đình trong hộ gia đình.



Các gia đình nên tiếp tục thực hiện theo các biện pháp an toàn được khuyến nghị để được bảo vệ tốt nhất.

### Trẻ nên tiêm loại vắc-xin nào?

Mọi trẻ em nên chủng ngừa ít nhất 2 liều. Các liều bổ sung có thể được khuyến nghị để được xem là cập nhật.



- Trẻ em từ **6 tháng-4 tuổi** nhận 3 liều chính của vắc-xin Pfizer hoặc 2 liều chính của vắc-xin Moderna
- Trẻ em **từ 5-11 tuổi** nhận 2 liều chính
- Trẻ em **từ 12-17 tuổi** nhận 2 liều chính



Trẻ em đã nhận 2 liều vắc-xin, bị suy giảm miễn dịch vừa hoặc nghiêm trọng, nên nhận thêm một liều chính sau 28 ngày kể từ ngày nhận liều thứ 2 và trẻ em trên 5 tuổi nên nhận một liều tăng cường. Các liều bổ sung cho các nhóm khác có thể được khuyến nghị trong tương lai.

Để được giải đáp những câu hỏi của quý vị:

Truy cập: [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids)

Gọi: 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), Nhấn phím #

Quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.

**Vaccinate WA**  
CovidVaccineWA.org

### COVID-19 có thật sự là rủi ro đối với con của tôi không?

Tuy trẻ nhiễm COVID-19 ít hơn so với người lớn, nhưng trẻ em có thể:

- Nhiễm vi-rút gây COVID-19
- Mắc bệnh hoặc tử vong do COVID-19
- Lây nhiễm COVID-19 cho người khác
- Có các biến chứng nghiêm trọng do COVID-19 như "COVID kéo dài" hoặc bệnh viêm nguy hiểm được gọi là MIS-C

Trong nhóm dân số này, vắc-xin cho thấy có rất ít phản ứng phụ và giúp bảo vệ họ rất tốt khỏi bệnh tật. Lợi ích của việc tiêm vắc-xin vượt xa so với rủi ro mắc COVID-19.

### Vắc-xin có an toàn cho con tôi không?

Có, vắc-xin được xem là rất an toàn cho trẻ em. Trong các thử nghiệm lâm sàng về vắc-xin ở thanh niên không phát hiện thấy các phản ứng phụ nghiêm trọng. Các nghiên cứu vẫn tiếp tục thực hiện và Hoa Kỳ có các hệ thống an toàn vắc-xin rất mạnh để sớm nắm bắt những dấu hiệu cảnh báo.

### Những phản ứng phụ thông thường của vắc-xin ở trẻ em là gì?

Những nguy cơ sức khỏe nếu trẻ em nhiễm COVID-19 cao hơn nhiều so với nguy cơ phản ứng phụ của vắc-xin.

Cũng như các loại vắc-xin khác, các phản ứng phụ phổ biến nhất là đau cánh tay, mệt mỏi, đau đầu và đau cơ. Những triệu chứng này thường nhẹ.

[Trong các thử nghiệm lâm sàng](#) (chỉ tiếng Anh) nhiều trẻ cho biết phản ứng phụ thường xảy ra sau khi tiêm liều thứ hai hơn là liều thứ nhất. Phản ứng phụ thường có mức độ nghiêm trọng nhẹ đến trung bình và thường xảy ra trong hai ngày sau khi tiêm vắc-xin, đa phần đều khỏi trong vòng một đến hai ngày.

### Trẻ em cần đem theo gì khi đến buổi hẹn tiêm vắc-xin?

Trong hầu hết mọi trường hợp, cha mẹ và người giám hộ sẽ cần chấp thuận để một người dưới 18 tuổi được tiêm vắc-xin. Họ sẽ hỏi địa điểm tiêm vắc-xin những điều họ cần làm để chấp thuận.

Phòng khám có thể hỏi ID của trẻ, thẻ bảo hiểm, hoặc Social Security number (số An Sinh Xã Hội), nhưng quý vị không cần phải cung cấp cho họ.

Trẻ em không cần phải là công dân Hoa Kỳ để được tiêm vắc-xin. Các địa điểm tiêm vắc-xin không được hỏi đến tình trạng nhập cư của bất kỳ ai. Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích y tế công cộng.

### Tôi có nhiều câu hỏi khác. Tôi có thể đi đâu?

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi khác trên trang [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids). Quý vị cũng có thể trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông thường của con quý vị.