

Vacunas obligatorias para la escuela: de precolar a 12.º grado

Del 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023



	DTaP/Tdap (difteria, tétanos, tos ferina)	Hepatitis B	Hib (<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b)	MMR (sarampión, paperas, rubéola)	PCV (neumocócica conjugada)	Polio	Varicela
Prescolar Desde los 19 meses hasta antes de cumplir los 4 años el 1/9/2022	4 dosis de DTaP	3 dosis	3 o 4 dosis** (según la vacuna)	1 dosis	4 dosis**	3 dosis	1 dosis***
Prescolar/jardín de infantes (incluido el jardín de infantes de transición) Edad = 4* años el 1/9/2022	5 dosis de DTaP**	3 dosis	3 o 4 dosis** (según la vacuna) (No obligatoria a partir de los 5 años)	2 dosis	4 dosis** (No obligatoria a partir de los 5 años)	4 dosis**	2 dosis***
Jardín de infantes hasta 6.º grado 5 años o mayor el 1/9/2022	5 dosis de DTaP**	3 dosis	No obligatoria	2 dosis	No obligatoria	4 dosis**	2 dosis***
De 7.º grado a 9.º grado	5 dosis de DTaP** Más Tdap a partir de los 10 años	3 dosis	No obligatoria	2 dosis	No obligatoria	4 dosis**	2 dosis***
De 10.º grado a 12.º grado	5 dosis de DTaP** Más Tdap a partir de los 7 años	3 dosis	No obligatoria	2 dosis	No obligatoria	4 dosis**	2 dosis***

* De acuerdo con el calendario de vacunación del Comité de Asesoramiento sobre Prácticas de Vacunación (por su sigla en inglés, ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (por su sigla en inglés, CDC). ** Pueden aceptarse menos dosis de las vacunas indicadas según la fecha en que se administraron. *** También es posible que el proveedor de atención médica verifique los antecedentes de varicela. Consulte la tabla de edades e intervalos mínimos en la página 2 para conocer la información sobre las edades y los intervalos mínimos requeridos para las dosis de las vacunas.

Encuentre información sobre otras vacunas recomendadas, pero no obligatorias, para la asistencia a un centro preescolar o de cuidado infantil en www.immunize.org/cdc/schedules.

Para obtener más información, revise el Resumen de requisitos de vacunación individual que puede encontrar en nuestra página web: www.doh.wa.gov/SCCI

Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127.

Las personas con sordera o problemas de audición deben llamar al 711 (Washington Relay)

o enviar un email a email.civil.rights@doh.wa.gov.

Vacuna	Dosis n.º	Edad mínima	Intervalo mínimo* entre dosis	Notas
Hepatitis B (Hep. B)	Dosis 1	Nacimiento	4 semanas entre la dosis 1 y 2	Se aceptan 2 dosis si ambas están documentadas como dosis para adultos de Recombivax HB* y se administraron entre los 11 y los 15 años. Cada dosis debe aplicarse en un lapso mínimo de 4 meses.
	Dosis 2	4 semanas	8 semanas entre la dosis 2 y 3	
	Dosis 3	24 semanas	16 semanas entre la dosis 1 y 3	
Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP y Tdap)	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre la dosis 1 y 2	Se recomienda un intervalo de 6 meses entre la dosis 3 y la dosis 4, pero un intervalo mínimo de 4 meses es aceptable. La dosis 5 no es necesaria si la dosis 4 se aplica a los 4 años o después y al menos 6 meses después de la dosis 3.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre la dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	6 meses entre la dosis 3 y 4	La DTaP se puede administrar a niños hasta los 6 años. Si es necesario aplicar dosis de rescate a los 7 años o más, se usa Tdap y luego dosis adicionales de Tdap o Td si es necesario.
	Dosis 4	12 meses	6 meses entre la dosis 4 y 5	Se requiere una dosis de refuerzo Tdap para todos los estudiantes en los grados 7 a 12.
	Dosis 5	4 años	—	Para los estudiantes de 7.º a 9.º grado, la dosis de Tdap es aceptable si se administra a los 10 años o después.
	Refuerzo	10 años	—	Para los estudiantes de 10.º a 12.º grado, la dosis de Tdap es aceptable si se administra a los 7 años o después.
Haemophilus influenzae tipo B (Hib)	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre la dosis 1 y 2	Si se administran las 3 dosis de PedvaxHIB, solo se necesitan 3 dosis en total. Para la dosis 3 el niño deberá tener 12 meses o más.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre la dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	8 semanas entre la dosis 3 y 4	Solo se requiere una dosis si se administra a los 15 meses o después.
	Dosis 4	12 meses	—	5 años o mayor: no se requiere porque no se administra de forma rutinaria a niños mayores de 5 años.
Neumocócica conjugada (PCV13)	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre la dosis 1 y 2	Solo se requiere una dosis si se administra a los 24 meses o después.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre la dosis 2 y 3	5 años o mayor: no se requiere porque no se administra de forma rutinaria a niños mayores de 5 años.
	Dosis 3	14 semanas	8 semanas entre la dosis 3 y 4	
	Dosis 4	12 meses	—	
Polio (IPV u OPV)	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre la dosis 1 y 2	La dosis 4 no es necesaria si la dosis 3 se aplica a los 4 años o después y al menos 6 meses después de la dosis 2.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre la dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	6 meses entre la dosis 3 y 4	La vacuna OPV administrada el 1/4/2016 o después de esa fecha no se acepta como dosis válida en el esquema.
	Dosis 4	4 años	—	Se recomienda completar el esquema de polio, pero no es obligatorio para los estudiantes mayores de 18 años. Para conocer la edad y los intervalos mínimos de 12.º grado, consulte el enlace Resumen de requisitos de vacunas individuales a continuación.
Sarampión, paperas y rubéola (MMR o MMRV)	Dosis 1	12 meses	4 semanas entre la dosis 1 y 2	MMRV (MMR + varicela) puede administrarse en lugar de la vacuna MMR y la vacuna contra la varicela por separado.
	Dosis 2	13 meses	—	Debe administrarse el mismo día que la vacuna contra la varicela O con un intervalo mínimo de 28 días, también consulte* la nota al pie.
Varicela (VAR)	Dosis 1	12 meses	3 meses entre la dosis 1 y 2 (12 meses a 12 años). 4 semanas entre la dosis 1 y 2 (mayores de 13 años)	Se recomienda: un lapso de 3 meses entre las dosis contra la varicela, pero es aceptable un intervalo mínimo de 28 días. La verificación de los antecedentes de enfermedades por parte del proveedor de atención médica es aceptable para documentar la inmunidad.
	Dosis 2	15 meses	—	Debe administrarse el mismo día que la vacuna MMR O con un intervalo mínimo de 28 días, también consulte* la nota al pie.

* El período de gracia de 4 días puede aplicarse a todas las dosis excepto entre dos dosis de vacunas con microbios vivos diferentes (como MMR, MMRV, varicela y Flumist).

Para obtener más información sobre los calendarios, consulte el Resumen de requisitos de vacunación individual en: <https://www.doh.wa.gov/SCCI>