

Повертаєтеся до коледжу?



Переконайтеся, що ви зробили всі необхідні щеплення вакциною проти менінгококової інфекції. Вакцинація – найкращий спосіб запобігти поширенню менінгококової інфекції.

Є три типи вакцини проти менінгококової інфекції, які захищають від кількох її різновидів.

Запитайте в лікаря, які вакцини проти менінгококової інфекції вам потрібні, якщо ви:

- студент коледжу, який проживає в гуртожитку;
- плануєте поїздку до країн, де розповсюджена менінгококова інфекція;
- маєте ослаблену імунну систему.

Вакцина проти менінгококової інфекції серогруп ACWY

Захищає від інфекцій чотирьох серогруп і підходить для всіх дітей віком від 11 до 12 років і бустерна вакцина для підлітків віком від 16 до 18 років.

Вакцина проти менінгококової інфекції серогрупи B (MenB)

Захищає від інфекцій серогрупи B; її слід вводити підліткам і дорослим віком від 16 до 23 років, які мають рідкісні захворювання або які перебувають у групі підвищеного ризику.

П'ятивалентна вакцина проти менінгококової інфекції серогруп ABCWY

Захищає від інфекцій п'яти серогруп і підходить тим, хто одночасно щеплюється вакцинами MenACWY і MenB.



ОСНОВНІ ФАКТИ

- Поширення менінгококової інфекції в кампусах коледжів, особливо серед студентів, які мешкають у гуртожитках, є серйозною проблемою.
- Менінгококова інфекція поширюється в разі близького контакту з інфікованими особами під час кашляння, поцілунків або спільного користування предметами, що контактують із ротовою порожниною, наприклад бальзамом для губ або зубними щітками.
- Якщо у вас є ознаки менінгококової хвороби, як-от ригідність шиї, головний біль, лихоманка, чутливість до світла та сплутаність свідомості, негайно зверніться до свого лікаря.

Не забувайте про щеплення від COVID-19 і грипу!

Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте на номер 1-800-525-0127.

Клієнтів із глухотою або з ослабленим слухом просимо телефонувати за номером 711 (Washington Relay)

або писати на адресу електронної пошти doh.information@doh.wa.gov.