

Повертаєтесь до коледжу?



Переконайтеся, що ви зробили всі необхідні щеплення вакциною проти менінгококової інфекції. Вакцинація – найкращий спосіб запобігти поширенню менінгококової інфекції.

Вам необхідно зробити щеплення двома вакцинами, які захищають від кількох різновидів менінгококової інфекції.

Запитайте в лікаря, які вакцини проти менінгококової інфекції вам потрібні, якщо ви:

- студент коледжу, який проживає в гуртожитку;
- плануєте поїздку до країн, де розповсюджена менінгококова інфекція;
- маєте ослаблену імунну систему.



Вакцина проти менінгококової інфекції серогрупи А, С, W, Y (MCV4) –

вакцина для всіх дітей віком від 11 до 12 років і бустерна вакцина для підлітків віком від 16 до 18 років. Серогрупи А, С, W та Y викликають більшість менінгококових інфекцій.

Вакцина проти менінгококової інфекції серогрупи В (MenB) захищає

від інфекцій серогрупи В; її слід вводити підліткам і дорослим віком від 16 до 23 років, які мають рідкісні захворювання або які перебувають у групі ризику через спалах менінгококової інфекції серогрупи В. Зверніться до лікаря, щоб з'ясувати, чи потрібна вам ця вакцина.

ОСНОВНІ ФАКТИ

- Поширення менінгококової інфекції в кампусах коледжів, особливо серед студентів, які мешкають у гуртожитках, є серйозною проблемою.
- Менінгококова інфекція поширюється в разі близького контакту з інфікованими особами під час кашляння, поцілунків або спільного користування предметами, що контактують із ротовою порожниною, наприклад бальзамом для губ або зубними щітками.
- Якщо у вас є ознаки менінгококової хвороби, як-от ригідність шиї, головний біль, лихоманка, чутливість до світла та сплутаність свідомості, негайно зверніться до свого лікаря.

Не забувайте про щеплення від COVID-19 і грипу!

Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте на номер 1-800-525-0127.

Якщо ви маєте вади слуху, зателефонуйте на номер 711 (Washington Relay) або надішліть листа на адресу електронної пошти civil.rights@doh.wa.gov.

DOH 348-086 April 2022 Ukrainian