

آنچه باید در مورد دواي خود براي عفونت سل نهفته (TB) بدانيد

ايزونيازيد و ريفاپنتين

به منظور تداوي عفونت سل نهفته براي شما دوا تجويز مي شود. شما به مرض سل مصاب نيسديد و نمي توانيد آن را به ديگران سرايت دهيد. اين دوا به شما کمک مي کند تا از مصاب به مرض سل پيشگيري کنيد.

انجام معاينات هفته وار خود را به خاطر داشته باشيد:

شما هر هفته براي مصرف دواهاي خود مسئول ارائه دهنده خدمات صحي را ملاقات خواهيد کرد. اين طرح تداوي با نظارت مستقيم نام دارد (DOT).

DOT به چندين طريق مي تواند به شما کمک کند.

- مسئول ارائه دهنده خدمات صحي به شما در يادآوري مصرف دواهاي خود کمک مي کند.
- شما تداوي را در اسرع وقت تکميل خواهيد کرد.
- مسئول ارايه دهنده خدمات صحي اطمينان حاصل مي کند که شما با مصرف دواها مشکلي نخواهيد داشت.
- طی معاينات هفته وار، اين شخص مي تواند به سوالات شما جواب دهد. همچنين، مي توانيد در مورد نگراني هاي خود با او صحبت کنيد.

هنگام مصرف اين دوا:

- ✓ اگر سوال يا نگراني در مورد دوا داريد، آن را با داکتر يا نرس خود در جريان بگذاريد.
- ✓ براي معاينات هفته وار مراجعه نماييد.
- ✓ در مورد مصرف مشروبات الکلي با داکتر خود صحبت کنيد. مصرف الکل مي تواند منجر به عوارض جانبي شود.
- ✓ در مورد تمام دواهايي که مصرف مي کنيد به داکتر خود اطلاع دهيد.
- ✓ حتماً به ساير داکترهاي خود اطلاع دهيد که تحت تداوي عفونت سل نهفته اسديد.
- ✓ برخي افراد متوجه شده اند که اين دواها هنگام مصرف به همراه غذا تأثير کمتری روی آنها مي گذارند.

برنامه دوايي عفونت سل نهفته:

(ارايه دهنده خدمات صحي: روز و تعداد مناسب براي تابليت ها را مشخص مي کند)

دوا	برنامه زماني	روز	تعداد تابليت در روز	طول دوره
ايزونيازيد و ريفاپنتين	يك بار در هفته	شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه		3 ماه (12 هفته)

داکتر مي تواند در کنار دوا براي شما ویتامين B6 تجويز کند.

يادداشت

نام داکتر من:

نام کلينیک من:

شماره تلفون کلينیک من:

ايست

مراقب اين مشکلات احتمالي باشيد:

اگر با هر يك از عوارض زير مواجه شده ايد، دست نگه داريد و با داکتر يا نرس متخصص سل تماس بگيريد:

- کاهش اشتها يا بي اشتهايي نسبت به غذا
- احساس ناراحتي در معده يا شکم دردی
- تب
- سردردی يا بدن دردی
- حالت تهوع يا استفراغ
- ادرار تيره يا مدفوع کم رنگ
- کبودی يا خونريزي آسان
- اندفاع جلدی و خارش
- زردی جلد يا چشم
- ضعف يا خستگي شديد
- سوزش يا بي حسی در دست و پا
- سرگيجه

تذکر: تغيير رنگ ادرار، بزاق يا اشک به رنگ نارنجی عادی محسوب مي شود. لنزهاي تماسی نرم ممکن است لکه دار شوند.



مرکز ملی پيشگيري از HIV/AIDS، هيپاتيت و ويروسی، STD و سل

بخش حذف سل