

# TRAITEMENTS COVID-19

## PETIT GUIDE

Type de traitements COVID-19	Prophylaxie Pré-Exposition	Anticorps monoclonaux	Antiviraux Oraux	Antiviraux IV
Ce qui existe	Evusheld	Bebtelovimab	Legeviro (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
Pour qui ?	<p>Adulte et enfant (d'au moins 12 ans et plus pesant au moins 40 kg) qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ne sont pas actuellement infectés par le SRAS-CoV-2 (COVID-19).</li> <li>n'ont pas eu de contact récent avec une personne infectée par le SRAS-CoV-2 (COVID-19).</li> <li>sont modérément à sévèrement immunodéprimés.</li> <li>à qui il n'est pas recommandé de recevoir le Vaccin contre la COVID-19.</li> </ul>	<p>Adultes et enfants (d'au moins 12 ans et plus pesant au moins 40 kg) qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ont un risque élevé d'évoluer vers un état grave de la COVID-19, dont une hospitalisation ou un décès.</li> </ul>	<p><b>Paxlovid :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adultes et enfants (d'au moins 12 ans et plus pesant au moins 40 kg).</li> </ul> <p><b>Legeviro :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adultes ayant un risque élevé d'évoluer vers un état grave de la COVID-19, dont une hospitalisation ou un décès.</li> <li>Adultes qui n'ont pas de traitement alternatif à la COVID-19 recommandé ou qui n'ont pas accès à d'autres traitements de la COVID-19.</li> </ul>	<p>Adultes et enfants (d'au moins 12 ans et plus pesant au moins 40 kg) qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sont hospitalisés</li> <li>ne sont pas hospitalisés et qui ont un risque élevé d'évoluer vers un état grave de la COVID-19, dont une hospitalisation ou un décès.</li> </ul> <p>Les enfants pesant entre 3,5 kg et 40 kg ou les enfants âgés de moins de 12 ans et pesant au moins 3.5 kg qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sont hospitalisés</li> <li>ne sont pas hospitalisés et qui ont un risque élevé d'évoluer vers un état grave de la COVID-19, dont une hospitalisation ou un décès.</li> </ul>
Quand y avoir droit?	2 semaines après la vaccination	Dans les 7 jours ou moins après avoir été testé positif à la COVID-19	Dans les 5 jours ou moins après avoir été testé positif à la COVID-19	Dans les 7 jours ou moins après avoir été testé positif à la COVID-19
Où y accéder ?	Chez les prestataires de soins de santé	Chez les prestataires de soins de santé	Chez les prestataires de soins de santé, les pharmacies locales	Dans les établissements de soins de santé pour les personnes hospitalisées

Vous pouvez trouver plus d'informations sur [hhs.gov](https://www.hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 French

Pour demander ce document dans un autre format, appelez le 1-800-525-0127. Clients sourds ou malentendants, veuillez appeler le 711 (Washington Relay) ou email [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).