

COVID-19-THERAPIEN KURZÜBERSICHT

Art der COVID-19-Therapie	Präexpositions-Prophylaxe	Monoklonale Antikörper	Was sind orale Virostatika	IV-Virostatika
Verfügbare Therapien	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
Für wen?	<p>Erwachsene und Kinder (mindestens 12 Jahre oder älter, mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg), die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derzeit nicht mit SARS-CoV-2 (COVID-19) infiziert sind. • keinen kürzlichen Kontakt mit einer Person hatten, bei der eine Infektion mit SARS-CoV-2 (COVID-19) bekannt ist. • mittelmäßig bis schwergradig immungeschwächt sind. • den COVID-19 Impfstoff – laut Abratung – nicht erhalten sollten. 	<p>Erwachsene und Kinder (mindestens 12 Jahre oder älter, mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg), die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • einem hohen Risiko ausgesetzt sind, einen schweren Verlauf von COVID-19 zu entwickeln, bis hin zum Krankenhausaufenthalt oder zum Tod. 	<p>Paxlovid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene und Kinder (mindestens 12 Jahre oder älter, mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg). <p>Lagevrio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwachsene, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind, einen schweren Verlauf von COVID-19 zu entwickeln, bis hin zum Krankenhausaufenthalt oder zum Tod. • Erwachsene, denen von alternativen COVID-19 Behandlungsoptionen abgeraten wird, oder die keinen Zugang zu anderen COVID-19-Behandlungen haben 	<p>Erwachsene und Kinder (mindestens 12 Jahre oder älter, mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg), die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hospitalisiert sind • nicht hospitalisiert sind und einem hohen Risiko ausgesetzt sind, einen schweren Verlauf von COVID-19 zu entwickeln, bis hin zum Krankenhausaufenthalt oder zum Tod. <p>Kinder mit einem Körpergewicht von 3,5 kg bis unter 40 kg oder Kinder unter 12 Jahren mit einem Körpergewicht von min. 3,5 kg, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hospitalisiert sind • nicht hospitalisiert sind und einem hohen Risiko ausgesetzt sind, einen schweren Verlauf von COVID-19 zu entwickeln, bis hin zum Krankenhausaufenthalt oder zum Tod.
Ab wann?	2 Wochen nach Impfung	Innerhalb von 7 Tagen oder weniger nach einem positiven Testergebnis auf COVID-19	Innerhalb von 5 Tagen oder weniger nach einem positiven Testergebnis auf COVID-19	Innerhalb von 7 Tagen oder weniger nach einem positiven Testergebnis auf COVID-19
Wo?	Gesundheitsdienstleister	Gesundheitsdienstleister	Gesundheitsdienstleister, örtliche Apotheken.	Stationäre Gesundheitseinrichtungen

Weitere Informationen finden Sie unter hhs.gov



DOH 825-035 May 2022 German

Um dieses Dokument in einem anderen Format zu erhalten, rufen Sie bitte 1-800-525-0127 an. Gehörlose oder schwerhörige Kunden können die Nummer 711 (Washington Relay) anrufen oder eine E-Mail an civil.rights@doh.wa.gov senden.