

# TERAPIAS CONTRA A COVID-19

## GUIA RÁPIDO

Tipos de terapias contra a COVID-19	Profilaxia pré-exposição	Anticorpos monoclonais	Antivirais orais	Antivirais via infusão intravenosa
O que está disponível	Evusheld	Bebtelovimab	Legeviro (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
Para quem é?	<p>Pacientes adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade pesando, pelo menos, 40 kg) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>no momento não estejam infectados com SARS-CoV-2 (COVID-19).</li> <li>não tenham sido expostos recentemente a uma pessoa infectada com SARS CoV-2 (COVID-19).</li> <li>sejam imunossuprimidos de forma moderada a severa.</li> <li>não podem receber a vacina contra a COVID-19.</li> </ul>	<p>Pacientes adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade pesando, pelo menos, 40 kg) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tenham alto risco de desenvolver a forma grave da COVID-19, incluindo hospitalização ou morte.</li> </ul>	<p>Paxlovid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pacientes adultos e crianças (a partir de 12 anos e pesando, pelo menos, 40 kg)</li> </ul> <p>Legeviro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos com alto risco de desenvolver a forma grave da COVID-19, incluindo hospitalização ou morte.</li> <li>Adultos que não podem receber opções alternativas de tratamento para COVID-19 ou não têm acesso a outros tratamentos para COVID-19</li> </ul>	<p>Pacientes adultos e crianças (a partir de 12 anos de idade pesando, pelo menos, 40 kg) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>estejam hospitalizados</li> <li>não estejam hospitalizados, mas têm alto risco de desenvolver a forma grave da COVID-19, incluindo hospitalização ou morte.</li> </ul> <p>Pacientes infantis pesando entre 3,5 kg e menos de 40 kg ou pacientes infantis menores de 12 anos de idade pesando, pelo menos, 3,5 kg que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>estejam hospitalizados</li> <li>não estejam hospitalizados, mas têm alto risco de desenvolver a forma grave da COVID-19, incluindo hospitalização ou morte.</li> </ul>
Quando posso receber?	Duas semanas após a vacina	Dentro de sete dias ou menos após testar positivo para COVID-19	Dentro de cinco dias ou menos após testar positivo para COVID-19	Dentro de sete dias ou menos após testar positivo para COVID-19
Como faço para receber?	Provedores de assistência médica	Provedores de assistência médica	Provedores de assistência médica ou Farmácias locais	Unidades de saúde que fazem internação

Mais informações estão disponíveis em [hhs.gov](https://hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 Brazilian Portuguese

Para solicitar este documento em outro formato, ligue para 1-800-525-0127. Os clientes com deficiência auditiva deverão ligar para 711 (Washington Relay) ou enviar um e-mail para [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).