

# ЛЕЧЕНИЕ COVID-19

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Тип лечения COVID-19	Доконтактная профилактика	Моно-клональные антитела	Пероральные противовирусные препараты	Внутривенные противовирусные препараты
Доступные препараты	Evusheld	Bebtelovimab	Legeviro (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
Кому подойдет?	<p>Пациенты взрослого и детского возраста (от 12 лет и старше, весом до 40 кг), которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на данный момент не инфицированы вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19);</li> <li>• в последнее время не контактировали с человеком, зараженным вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19);</li> <li>• страдают умеренной или сильной иммунной недостаточностью;</li> <li>• имеют противопоказания к использованию вакцин от COVID-19.</li> </ul>	<p>Пациенты взрослого и детского возраста (от 12 лет и старше, весом от 40 кг), которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подвержены высокому риску тяжелого течения COVID-19, включая госпитализацию или смерть.</li> </ul>	<p><b>Paxlovid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пациенты взрослого и детского возраста (от 12 лет и старше, весом от 40 кг)</li> </ul> <p><b>Legeviro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• взрослые, подверженные высокому риску тяжелого течения COVID-19, включая госпитализацию</li> <li>• взрослые, которым не рекомендованы альтернативные варианты лечения COVID-19 или у которых нет доступа к другим видам лечения COVID-19.</li> </ul>	<p>Пациенты взрослого и детского возраста (от 12 лет и старше, весом от 40 кг), которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• госпитализированы;</li> <li>• не госпитализированы и подвержены высокому риску тяжелого течения COVID-19, включая госпитализацию или смерть.</li> </ul> <p>Пациенты детского возраста весом от 3,5 до 40 кг или пациенты детского возраста до 12 лет, весом от 3,5 кг, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• госпитализированы;</li> <li>• не госпитализированы и подвержены высокому риску тяжелого течения COVID-19 включая госпитализацию или смерть.</li> </ul>
Когда принимать?	Через 2 недели после вакцинации	В течение не более 7 дней после получения положительного результата теста на COVID-19	В течение не более 5 дней после получения положительного результата теста на COVID-19	В течение не более 7 дней после получения положительного результата теста на COVID-19
Где достать?	Медицинские работники	Медицинские работники	Медицинские работники, местные аптеки	Стационарные медицинские учреждения

Дополнительную информацию можно найти на сайте [hhs.gov](https://hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 Russian

Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по номеру 1-800-525-0127. Если вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной почте [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).