

MGA THERAPY PARA SA COVID-19

MAIKLING GABAY

Uri ng mga Therapy para sa COVID-19	Pre-Exposure Prophylaxis	Mga Monoclonal Antibody	Mga Oral Antiviral	Mga IV Antiviral
Ang mga maaaring gamitin	Evusheld	Bebtelovimab	Legeviro (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
Para kanino ito?	<p>Para sa mga nasa hustong gulang at batang pasyente (na 12 taong gulang pataas, na may timbang na hindi bababa sa 40 kg) na:</p> <ul style="list-style-type: none"> walang SARS-CoV-2 (COVID-19) sa kasalukuyan. hindi nalantad kamakailan sa isang indibidwal na may SARS CoV-2 (COVID-19). katamtaman hanggang sa malubhang immunocompromised (may kondisyong nagpapahina ng immune system). hindi inirerekomendang makatanggap ng bakuna sa COVID-19. 	<p>Para sa mga nasa hustong gulang at batang pasyente (na 12 taong gulang paatas, na may timbang na hindi bababa sa 40 kg) na:</p> <ul style="list-style-type: none"> may mataas na panganib na magkaroon ng malubhang COVID-19, kasama na ang pagpapaospital o pagkamatay. 	<p>Paxlovid:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mga nasa hustong gulang at batang pasyente (na 12 taong gulang pataas, na may timbang na hindi bababa sa 40 kg). <p>Legeviro:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mga nasa hustong gulang na may mataas na panganib na magkaroon ng malubhang COVID-19, kasama na ang pagpapaospital o pagkamatay. Mga nasa hustong gulang na hindi inirerekomendang makatanggap ng mga alternatibong opsiyon sa paggamot sa COVID-19 o walang magagamit na ibang paraan ng paggamot sa COVID-19. 	<p>Para sa mga nasa hustong gulang at batang pasyente (na 12 taong gulang pataas, na may timbang na hindi bababa sa 40 kg) na:</p> <ul style="list-style-type: none"> naospital hindi naospital at may mataas na panganib na magkaroon ng malubhang COVID-19, kasama na ang pagpapaospital o pagkamatay. <p>Mga batang pasyente na may timbang na 3.5 kg hanggang sa mas mababa sa 40 kg o mga batang pasyente na wala pang 12 taong gulang, na may timbang na hindi bababa sa 3.5 kg na:</p> <ul style="list-style-type: none"> naospital hindi naospital at may mataas na panganib na magkaroon ng malubhang COVID-19, kasama na ang pagpapaospital o pagkamatay.
Kailan ito gagamitin?	2 linggo matapos mabakunahan	Sa loob ng 7 araw o mas kaunti matapos magpositibo sa COVID-19	Sa loob ng 5 araw o mas kaunti matapos magpositibo sa COVID-19	Sa loob ng 7 araw o mas kaunti matapos magpositibo sa COVID-19
Paano ito gagamitin?	Mga Provider ng Pangangalagang Pangkalusugan	Mga Provider ng Pangangalagang Pangkalusugan	Mga Provider ng Pangangalagang Pangkalusugan, mga Lokal na parmasya	Mga pasilidad para sa pangangalagang pangkalusugan na inpatient

Makakahanap ng iba pang impormasyon sa [hhs.gov](https://www.hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 Tagalog

Upang hilingin ang dokumentong ito sa ibang format, tumawag sa 1-800-525-0127. Para sa mga kostumer na bingi o nahihirapang makarinig, mangyaring tumawag sa 711 (Washington Relay) o mag-email sa civil.rights@doh.wa.gov.