

# HƯỚNG DẪN NHANH VỀ THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19

Các Loại Thuốc Điều Trị COVID-19	Điều Trị Dự Phòng Trước Phơi Nhiễm	Kháng Thể Đơn Dòng	Thuốc Kháng Vi-rút Đường Uống	Thuốc Kháng Vi-rút IV
Loại nào có sẵn	Evusheld	Bebtelovimab	Legeviro (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
Sử dụng cho ai?	Bệnh nhân người lớn và trẻ em (ít nhất từ 12 tuổi trở lên và nặng ít nhất 40kg), là những người: <ul style="list-style-type: none"><li>hiện không nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19).</li><li>gần đây được biết là không có tiếp xúc nào với một người bị nhiễm SARS CoV-2 (COVID-19).</li><li>bị suy giảm miễn dịch ở mức độ vừa đến nghiêm trọng.</li><li>không được khuyến cáo nhận vắc-xin ngừa COVID-19.</li></ul>	Bệnh nhân người lớn và trẻ em (ít nhất từ 12 tuổi trở lên và nặng ít nhất 40kg), là những người: <ul style="list-style-type: none"><li>có nguy cơ cao bệnh trở nặng khi mắc COVID-19, bao gồm nhập viện hoặc tử vong.</li></ul>	<b>Paxlovid:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bệnh nhân người lớn và trẻ em (từ 12 tuổi trở lên và nặng ít nhất 40kg).</li></ul> <b>Legeviro:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Người lớn có nguy cơ cao bệnh trở nặng khi mắc COVID-19, bao gồm nhập viện hoặc tử vong.</li><li>Người lớn không được khuyến cáo các tùy chọn điều trị COVID-19 hoặc không có khả năng tiếp cận phương pháp điều trị COVID-19 khác</li></ul>	Bệnh nhân người lớn và trẻ em (từ 12 tuổi trở lên và nặng ít nhất 40kg), là những người: <ul style="list-style-type: none"><li>đang nằm viện</li><li>không nằm viện và có nguy cơ cao bệnh trở nặng khi mắc COVID-19, bao gồm nhập viện hoặc tử vong.</li></ul> Bệnh nhân trẻ em nặng 3,5kg đến dưới 40kg hoặc bệnh nhân trẻ em dưới 12 tuổi và nặng ít nhất 3,5kg, là những người: <ul style="list-style-type: none"><li>đang nằm viện</li><li>không nằm viện và có nguy cơ cao bệnh trở nặng khi mắc COVID-19, bao gồm nhập viện hoặc tử vong.</li></ul>
Sử dụng khi nào?	2 tuần sau khi tiêm vắc-xin	Trong vòng từ 7 ngày trở xuống sau khi có xét nghiệm dương tính với COVID-19	Trong vòng từ 5 ngày trở xuống sau khi có xét nghiệm dương tính với COVID-19	Trong vòng từ 7 ngày trở xuống sau khi có xét nghiệm dương tính với COVID-19
Sử dụng như thế nào?	Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe	Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe	Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe, Hiệu thuốc tại địa phương	Cơ sở chăm sóc sức khỏe nội trú

Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại [hhs.gov](https://hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 Vietnamese

Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email tới [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).