

適用於所有年齡段人群的 COVID-19 疫苗加強針參考指南



您或您的孩子已接種了 COVID-19 初始系列疫苗，以保護您自己和他人免受因 COVID-19 所引起的重症、住院及身故的影響。研究表明，雖然 COVID-19 疫苗仍然有效，但疫苗的保護作用可能會隨著時間的推移而下降。

現在，接種加強針疫苗仍然是繼續保持這種防護效果的最有效方式。

請參閱下方圖表，以確認您或您的孩子是否有資格接種一劑或多劑 COVID-19 疫苗的加強針。^{*}

	哪些人群符合 接種資格？	我應該於何時 接種加強針？	我可以接種 第二劑加強針嗎？	應該接種 哪種加強針？
如果您已經接種了... Pfizer 疫苗	5 歲以上 的所有人均應該接種加強針，以保持最新的疫苗接種。	在完成 Pfizer 初始系列疫苗接種後至少滿 5 個月 。	50 歲以上的所有人均應該在接種第 1 劑加強針疫苗至少滿 4 個月 後再接種第 2 劑加強針疫苗。	18 歲以上的成年人 可以接種任何 mRNA COVID-19 疫苗的加強針。 5-17 歲的兒童 應該接種 Pfizer 加強針疫苗。
如果您已經接種了... Moderna 疫苗	18 歲以上 的成年人均應該接種加強針，以保持最新的疫苗接種。	在完成 Moderna 初始系列疫苗接種後至少滿 5 個月 。	50 歲以上的所有人均應該在接種第 1 劑加強針疫苗至少滿 4 個月 後再接種第 2 劑加強針疫苗。	任何 mRNA COVID-19 疫苗的加強針疫苗。
如果您已經接種了... Johnson & Johnson 疫苗	18 歲以上 的成年人均應該接種加強針，以保持最新的疫苗接種。	在完成 J&J 初始系列疫苗接種後至少滿 2 個月 。	50 歲以上的所有人以及那些已接種 J&J 疫苗的初始疫苗及加強針疫苗的人員，均應該在接種第 1 劑加強針疫苗至少滿 4 個月 後再接種第 2 劑加強針疫苗。	針對第 1 劑接種 J&J 加強針疫苗的人員，應首選接種任何 mRNA 疫苗的加強針疫苗。第 2 劑加強針應該選擇接種任何 mRNA COVID-19 疫苗。
如果您已經接種了... Novavax 疫苗	如果您已接種 Novavax 疫苗作為您的初始劑次疫苗，則您目前沒有資格接種任何品牌疫苗的加強針。			

如果您屬於中重度免疫功能低下的人群，指南內容會有所不同。

^{*}最近感染過 SARS-CoV-2 的人員可以考慮將第一劑或第二劑 COVID-19 疫苗加強針的接種時間自出現症狀或檢測呈陽性起，推遲 3 個月（如果感染時無症狀）。**研究表明**（英文），增加感染和接種疫苗之間的時間，可能會帶來使疫苗接種的免疫反應獲得改善的效果。另外，觀察結果顯示，在感染後的幾週至幾個月內，再次感染的風險也較低。在決定感染後是否推遲接種加強針時，還應考慮例如 COVID-19 **重症**的風險、**COVID-19 社區疫情程度**或主要 SARS-CoV-2 毒株的特徵等方面的個性化因素。

COVID-19 疫苗加強針常見問題解答

為什麼加強針很重要？

加強針將有助於提供對抗重症的持續防護作用。此前，僅建議面臨 COVID-19 重症的高風險人群接種加強針，但現在建議擴大至包括 5 歲及以上已接種 Pfizer 初始系列疫苗的人群，以幫助增加對 COVID-19 疾病的防護。某些人群，例如中重度免疫功能低下的人群，可能需要接種額外劑次的疫苗來提高免疫力。由於出現了傳染性更強的變種病毒以及 COVID-19 病例數量在美國各地持續增加，接種加強針尤為重要。

如果需要接種加強針，那麼這是否意味著疫苗並沒有發揮作用？

否。美國目前接種的 COVID-19 疫苗在預防重症、住院及死亡方面效果良好，甚至可預防病毒變體。但公共衛生專家發現，對於輕中度 COVID-19 疾病的防護程度有所下降，尤其是高危群體。

在前往加強針赴約時，我應該帶些什麼？

在前往加強針赴約時，[請攜帶您/您孩子的疫苗接種卡](#)，以便服務提供者可以先行確認初始系列劑次是否已完成接種。如果疫苗接種卡丟失，服務提供者可以查找您的記錄。

額外劑次和加強劑次有何區別？

額外劑次適用於完成 2 劑 mRNA 疫苗（Pfizer 或 Moderna）接種，但未產生強烈免疫反應的免疫功能低下患者。

加強劑次適用於在初始劑次的效果隨時間推移而減弱後，以增強或恢復防護效果和/或免疫力。

疫苗品牌會對加強針有影響嗎？

如果您已年滿 18 歲或以上，並且已經接種 Johnson & Johnson 疫苗或 2 劑 mRNA 疫苗作為您的初始劑次疫苗，則您可以接種與初始系列疫苗不同的加強針疫苗。Centers for Disease Control and Prevention（CDC，疾病控制與預防中心）在對最新資料（Moderna、Johnson & Johnson 及加強針混打）進行審查並圍繞加強針進行激烈而審慎的討論後做出此決定。Novavax 疫苗目前尚未推薦為加強針，並且也不應該與其他 COVID-19 疫苗混合或搭配接種。**17 歲及以下的人群（如果已接種 Pfizer 初始系列疫苗）在接種加強針時僅可接種 Pfizer 疫苗。**

何時會被視為已接種全部劑次的疫苗？

在接種 COVID-19 疫苗初始系列建議的全部劑次 2 週後，您或您的孩子會被視為**已接種全部劑次的疫苗**。

在符合資格的情況下，在接種了初始系列疫苗的所有劑次和**所有建議的加強針**的時候，您或您的孩子會被視為完成了**最新的 COVID-19 疫苗**的接種。

加強針是否可以與其他疫苗一起接種，例如流感疫苗？

是的。在接種其他疫苗的同時，您或您的孩子可以接種 COVID-19 疫苗。您無需將孩子的[入學強制接種疫苗](#)（英文）或建議的其他疫苗與 COVID-19 疫苗接種分開排期。在預約 COVID-19 疫苗接種的同時，還可趁此機會讓您或您的孩子補種所有建議的疫苗。

仍有更多疑問？請造訪：
doh.wa.gov/covidbooster