



# Guide de référence sur les doses de rappel des vaccins COVID-19 pour tous les âges

Vous ou votre enfant avez reçu un schéma vaccinal initial complet d'un vaccin contre le COVID-19 pour vous protéger, vous et les autres, contre une forme grave de la maladie, le risque d'hospitalisation et le décès en cas d'infection par le COVID-19. Des études ont démontré que, bien que les vaccins contre le COVID-19 restent efficaces, la protection qu'ils offrent diminue au fil du temps.

**Désormais, l'administration de doses de rappel est la manière la plus efficace de maintenir cette protection.**

Consultez le tableau ci-dessous pour savoir si vous ou votre enfant pouvez recevoir une dose de rappel de vaccin COVID-19.\*

Si vous avez reçu...	Qui doit recevoir une dose de rappel	Quelle dose de rappel recevoir	Quand recevoir une dose de rappel
Moderna	Les personnes âgées de 6 mois et plus	Les enfants âgés de 6 mois à 4 ans doivent recevoir une dose du vaccin modifié (bivalent) de la même marque que le vaccin reçu dans leur schéma vaccinal initial.	Au moins 2 mois après avoir reçu la dernière dose (schéma vaccinal initial ou dose de rappel d'un vaccin monovalent)
		Les personnes âgées de 5 ans et plus doivent recevoir une dose de rappel du vaccin modifié (bivalent) de Pfizer ou Moderna	
		Les personnes âgées de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel précédente peuvent également choisir de recevoir une dose de rappel du vaccin Novavax si elles ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas, recevoir une dose de rappel d'un vaccin à ARNm modifié.	Au moins 6 mois après un schéma vaccinal initial complet.
Pfizer	Les personnes âgées de 5 ans et plus	Les enfants âgés de 5 ans qui ont reçu un vaccin Pfizer peuvent uniquement recevoir une dose de rappel du vaccin modifié (bivalent) de Pfizer	Au moins 2 mois après avoir reçu la dernière dose (schéma vaccinal initial ou dose de rappel d'un vaccin monovalent)
		Les personnes âgées de 6 ans et plus doivent recevoir une dose de rappel du vaccin modifié (bivalent) de Pfizer ou de Moderna, indépendamment de la marque du vaccin reçu dans leur schéma vaccinal initial	
		Les personnes âgées de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel précédente peuvent également choisir de recevoir une dose de rappel du vaccin Novavax si elles ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas, recevoir une dose de rappel d'un vaccin à ARNm modifié.	Au moins 6 mois après un schéma vaccinal initial complet.
Johnson & Johnson	Les personnes âgées de 18 ans et plus	Les personnes âgées de 18 ans et plus doivent recevoir une dose de rappel du vaccin modifié (bivalent) de Pfizer ou de Moderna	Au moins 2 mois après avoir reçu la dernière dose (schéma vaccinal initial ou dose de rappel d'un vaccin monovalent)
		Les personnes âgées de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel précédente peuvent également choisir de recevoir une dose de rappel du vaccin Novavax si elles ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas, recevoir une dose de rappel d'un vaccin à ARNm modifié.	Au moins 6 mois après un schéma vaccinal initial complet.
Novavax	Les personnes âgées de 12 ans et plus	Les personnes âgées de 12 ans et plus doivent recevoir une dose de rappel du vaccin modifié (bivalent) de Pfizer ou de Moderna	Au moins 2 mois après un schéma vaccinal initial complet
		Les personnes âgées de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel précédente peuvent également choisir de recevoir une dose de rappel du vaccin Novavax si elles ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas, recevoir une dose de rappel d'un vaccin à ARNm modifié.	Au moins 6 mois après un schéma vaccinal initial complet.

*Si vous êtes atteint d'une immunodépression modérée ou sévère, les directives vous concernant peuvent varier.*

\*Les personnes qui ont récemment été infectées par le SRAS-CoV-2 peuvent envisager de reporter leur dose initiale ou dose de rappel de vaccin COVID-19 de 3 mois à compter de l'apparition des symptômes ou de l'obtention d'un test positif (en cas d'infection sans symptômes visibles). Des études ont démontré (en anglais) qu'allongement du délai entre l'infection et la vaccination peut entraîner une meilleure réponse immunitaire à la vaccination. Par ailleurs, un faible risque de réinfection a été observé dans les semaines ou les mois suivant l'infection. Des facteurs individuels, comme le risque de forme grave (en anglais) du COVID-19, le niveau d'infection communautaire par le COVID-19 (en anglais) ou les caractéristiques de la souche prédominante du SRAS-CoV-2 doivent être pris en compte pour déterminer s'il convient de reporter l'administration d'une dose de rappel après l'infection.

# FAQ sur les doses de rappel de vaccin COVID-19

## Qu'est-ce qu'une dose de rappel de vaccin modifié/bivalent ?

Une dose de rappel d'un vaccin COVID-19 modifié/bivalent est une formule vaccinale qui renforce l'immunité contre la souche originale du coronavirus et protège également contre les nouveaux variants d'Omicron qui représentent la plupart des cas actuels. Les doses de rappel du vaccin modifié offrent une protection optimale contre le virus et permettent de remédier à la diminution de l'efficacité du vaccin au fil du temps.

## Pourquoi les doses de rappel sont-elles importantes ?

Les doses de rappel permettent d'assurer une protection continue contre les formes graves de la maladie. Toutes les personnes âgées de 5 ans et plus doivent recevoir une dose de rappel pour rester à jour de leurs vaccins. Certaines populations, comme les personnes qui souffrent d'immunodépression modérée ou grave, peuvent avoir besoin de doses supplémentaires pour augmenter leur immunité. C'est particulièrement important avec l'apparition de variants plus contagieux et l'augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis.

## Si des rappels sont nécessaires, est-ce que cela signifie que les vaccins ne sont pas efficaces ?

Non. Les vaccins COVID-19 actuellement proposés aux États-Unis sont efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès, même contre les variants. Toutefois, les experts en santé publique constatent une réduction de la protection contre les formes légères et modérées du COVID-19, en particulier chez les personnes à haut risque. Les doses de rappel du vaccin modifié/bivalent ont été créées pour renforcer l'immunité et fournir une meilleure protection contre certains des variants les plus récents qui circulent.

## Que dois-je apporter lors du rendez-vous pour la dose de rappel ?

[Veuillez apporter votre carte de vaccination/la carte de vaccination de votre enfant](#) lors du rendez-vous pour la dose de rappel afin que le professionnel de santé puisse confirmer que le schéma vaccinal initial est bien complet. Si vous avez égaré la carte, le professionnel de santé pourra consulter votre dossier sur son ordinateur.

## Quelle est la différence entre une dose de vaccin supplémentaire et une dose de rappel ?

Une dose supplémentaire est destinée aux patients immunodéprimés qui ont reçu un schéma vaccinal initial de 2 doses de vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) mais qui n'ont pas obtenu une réponse immunitaire suffisamment forte.

Une dose de rappel est administrée pour renforcer ou rétablir la protection et/ou l'immunité après que l'efficacité du schéma vaccinal initial se soit amoindrie avec le temps.

## Quelle marque de vaccin puis-je recevoir en dose de rappel ?

Les enfants âgés de 6 mois à 4 ans doivent recevoir une dose de vaccin modifié (bivalent) de la même marque que le vaccin reçu dans leur schéma vaccinal initial.

Les enfants âgés de 5 ans qui ont obtenu un schéma vaccinal initial du vaccin Pfizer doivent uniquement recevoir une dose de rappel du vaccin modifié (bivalent) de Pfizer.

Les enfants âgés de 5 ans qui ont reçu le vaccin Moderna peuvent recevoir une dose de rappel du vaccin modifié (bivalent) de Moderna ou Pfizer.

Les personnes âgées de 6 ans et plus peuvent recevoir une dose de rappel du vaccin modifié (bivalent) de Pfizer ou Moderna, quelle que soit la marque du vaccin reçu dans leur schéma vaccinal initial ou leur précédente dose de rappel.

Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent également choisir de recevoir une dose de rappel du vaccin Novavax si elles ont reçu un schéma vaccinal initial complet mais n'ont pas reçu de dose de rappel précédemment - et si elles ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas, recevoir une dose de rappel d'un vaccin à ARNm modifié.

## Quand une personne est-elle considérée à jour de ses vaccins ?

Vous êtes à jour de vos vaccins COVID-19 si vous avez terminé votre schéma vaccinal initial et reçu la toute dernière dose de rappel recommandée pour vous par les CDC.

## Peut-on recevoir la dose de rappel en même temps que d'autres vaccins, comme celui de la grippe ?

Oui. Vous ou votre enfant pouvez recevoir un vaccin COVID-19 en même temps que d'autres vaccins. Vous n'avez pas besoin de programmer les [vaccins scolaires obligatoires](#) (en anglais) de votre enfant ou d'autres vaccins recommandés séparément du vaccin contre le COVID-19. Un rendez-vous pour l'administration du vaccin COVID-19 est l'occasion de mettre à jour vos vaccins recommandés ou les vaccins recommandés de votre enfant.

**D'autres questions ? Consultez : [doh.wa.gov/covidbooster](https://doh.wa.gov/covidbooster)**