

Guide de référence sur les doses de rappel des vaccins COVID-19 pour tous les âges



Vous ou votre enfant avez reçu un schéma vaccinal initial complet d'un vaccin contre le COVID-19 pour vous protéger, vous et les autres, contre une forme grave de la maladie, le risque d'hospitalisation et le décès en cas d'infection par le COVID-19. Des études ont démontré que, bien que les vaccins contre le COVID-19 restent efficaces, la protection qu'ils offrent diminue au fil du temps.

Désormais, l'administration de doses de rappel est la manière la plus efficace de maintenir cette protection.

Consultez le tableau ci-dessous pour savoir si vous ou votre enfant pouvez recevoir une ou plusieurs doses de rappel du vaccin COVID-19.*

	Qui peut recevoir une dose de rappel ?	Quand dois-je recevoir une dose de rappel ?	Puis-je recevoir une dose de rappel ?	Quelle dose de rappel ?
<p><i>Si vous avez reçu...</i></p> <p>Pfizer</p>	Toutes les personnes âgées de 5+ ans doivent recevoir leur dose de rappel pour être à jour de leurs vaccinations.	Au moins 5 mois après un schéma vaccinal initial complet avec le vaccin Pfizer.	Toutes les personnes âgées de 50+ ans doivent recevoir une 2ème dose de rappel au moins 4 mois après avoir reçu leur 1ère dose de rappel.	Les adultes âgés de 18+ ans peuvent recevoir une dose de rappel de n'importe quel vaccin COVID-19 à ARNm. Les enfants âgés de 5 à 17 ans doivent recevoir une dose de rappel du vaccin Pfizer.
<p><i>Si vous avez reçu...</i></p> <p>Moderna</p>	Les adultes âgés de 18+ ans doivent recevoir leur dose de rappel pour être à jour de leurs vaccinations.	Au moins 5 mois après un schéma vaccinal initial complet avec le vaccin Moderna.	Toutes les personnes âgées de 50+ ans doivent recevoir une 2ème dose de rappel au moins 4 mois après avoir reçu leur 1ère dose de rappel.	Une dose de rappel de n'importe quel vaccin COVID-19 à ARNm.
<p><i>Si vous avez reçu...</i></p> <p>Johnson & Johnson</p>	Les adultes âgés de 18+ ans doivent recevoir leur dose de rappel pour être à jour de leurs vaccinations.	Au moins 2 mois après un schéma vaccinal initial complet du vaccin J&J.	Toutes les personnes âgées de 50+ ans et les personnes qui ont reçu un vaccin J&J pour leur vaccination initiale et leur dose de rappel doivent recevoir une 2ème dose de rappel au moins 4 mois après avoir reçu leur 1ère dose de rappel.	Pour la première dose de rappel, il est préférable de recevoir une dose de n'importe quel vaccin COVID-19 à ARNm plutôt qu'une dose du vaccin J&J. La 2ème dose de rappel doit être une dose de n'importe quel vaccin COVID-19 à ARNm.
<p><i>Si vous avez reçu...</i></p> <p>Novavax</p>	Si vous avez reçu le vaccin Novavax pour votre schéma vaccinal initial, vous ne pouvez pas recevoir une dose de rappel d'une quelconque marque pour le moment.			

Si vous êtes atteint d'une immunodépression modérée ou sévère, les directives vous concernant peuvent varier.

*Les personnes qui ont récemment été infectées par le SRAS-CoV-2 peuvent envisager le **report de leur première ou deuxième dose de rappel du vaccin COVID-19 de 3 mois à compter de l'apparition des symptômes ou de l'obtention d'un test positif (si l'infection était asymptomatique)**. Des études ont démontré (en anglais seulement) qu'un allongement du délai entre l'infection et la vaccination peut entraîner une meilleure réponse immunitaire à la vaccination. Par ailleurs, un faible risque de réinfection a été observé dans les semaines ou les mois suivant l'infection. Des facteurs individuels, comme le risque de forme grave du COVID-19 (en anglais seulement), le niveau d'infection communautaire par le COVID-19 (en anglais seulement) ou les caractéristiques de la souche prédominante du SRAS-CoV-2 doivent être pris en compte pour déterminer s'il convient de reporter l'administration d'une dose de rappel après l'infection.

FAQ sur les doses de rappel de vaccin COVID-19

Pourquoi les doses de rappel sont-elles importantes ?

Les doses de rappel permettent d'assurer une protection continue contre les formes graves de la maladie. Les doses de rappel n'étaient auparavant recommandées que pour les populations à haut risque de contracter une forme grave du COVID-19, mais la recommandation a été élargie pour inclure les personnes âgées de 5 ans et plus qui ont reçu un schéma vaccinal initial du vaccin Pfizer, afin de renforcer la protection contre le COVID-19. Certaines populations, comme les personnes qui souffrent d'immunodépression modérée ou grave, peuvent avoir besoin de doses supplémentaires pour augmenter leur immunité. C'est particulièrement important avec l'apparition de variants plus contagieux et l'augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis.

Si des rappels sont nécessaires, est-ce que cela signifie que les vaccins ne sont pas efficaces ?

Non. Les vaccins COVID-19 actuellement proposés aux États-Unis sont efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès, même contre les variants. Toutefois, les experts en santé publique constatent une réduction de la protection contre les formes légères et modérées du COVID-19, en particulier chez les personnes à haut risque.

Que dois-je apporter lors du rendez-vous pour la dose de rappel ?

[Veillez apporter votre carte de vaccination/la carte de vaccination de votre enfant](#) lors du rendez-vous pour la dose de rappel afin que le professionnel de santé puisse confirmer que le schéma vaccinal initial est bien complet. Si vous avez égaré la carte, le professionnel de santé pourra consulter votre dossier sur son ordinateur.

Quelle est la différence entre une dose de vaccin supplémentaire et une dose de rappel ?

Une dose supplémentaire est destinée aux patients immunodéprimés qui ont reçu un schéma vaccinal initial de 2 doses de vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) mais qui n'ont pas obtenu une réponse immunitaire suffisamment forte.

Une dose de rappel est administrée pour renforcer ou rétablir la protection et/ou l'immunité après que l'efficacité du schéma vaccinal initial se soit amoindrie avec le temps.

La marque utilisée a-t-elle de l'importance pour la dose de rappel ?

Pour la dose de rappel, vous pouvez recevoir un vaccin différent de celui que vous avez reçu dans votre schéma vaccinal initial si vous avez 18 ans ou plus et avez reçu le vaccin Johnson & Johnson ou un vaccin à ARNm comprenant deux doses pour votre schéma vaccinal initial. Les Centers for Disease Control and prevention (CDC, centres de contrôle et de prévention des maladies) ont pris leur décision à la suite d'un examen minutieux des données les plus récentes (Moderna, Johnson & Johnson, combinaison de doses de rappel) et d'une discussion approfondie et délibérée à propos des doses de rappel. À l'heure actuelle, Novavax ne recommande pas l'administration d'une dose de rappel, et ce vaccin ne doit pas être mélangé ou associé à d'autres vaccins COVID-19. **Les personnes âgées de 17 ans et moins peuvent uniquement recevoir le vaccin Pfizer pour leur dose de rappel s'ils ont reçu un schéma vaccinal initial Pfizer.**

Quand une personne est-elle considérée comme totalement vaccinées ?

Vous ou votre enfant êtes **totalement vaccinés** deux semaines après avoir reçu toutes les doses recommandées du schéma vaccinal initial contre le COVID-19.

Vous ou votre enfant êtes **à jour** de vos vaccinations contre le COVID-19 lorsque toutes les doses du schéma vaccinal initial et [toutes les doses de rappel recommandées](#) (en anglais seulement) auxquelles vous avez droit ont été administrées.

Peut-on recevoir la dose de rappel en même temps que d'autres vaccins, comme celui de la grippe ?

Oui. Vous ou votre enfant pouvez recevoir un vaccin COVID-19 en même temps que d'autres vaccins. Vous n'avez pas besoin de programmer les [vaccins scolaires obligatoires de votre enfant](#) (en anglais seulement) ou d'autres vaccins recommandés séparément du vaccin contre le COVID-19. Un rendez-vous pour l'administration du vaccin COVID-19 est l'occasion de mettre à jour vos vaccins recommandés ou les vaccins recommandés de votre enfant.

Vous avez d'autres questions ?

Consultez : doh.wa.gov/covidbooster