

Orientierungshilfe für COVID-19-Auffrischimpfungen für alle Altersgruppen



Sie oder Ihr Kind haben eine Grundimmunisierung gegen COVID-19 erhalten, um sich und andere vor einer schweren Erkrankung, einem Krankenhausaufenthalt und sogar dem Tod durch COVID-19 zu schützen. Studien haben gezeigt, dass COVID-19-Impfstoffe zwar wirksam bleiben, aber im Laufe der Zeit mit einem Nachlassen des Schutzes verbunden sind.

Daher ist die Auffrischung nach nun der effektivste Weg, um diesen Schutz fortzusetzen.

Sehen Sie sich die folgende Übersicht an, um herauszufinden, ob Sie oder Ihr Kind für eine oder mehrere Auffrischimpfungen gegen COVID-19 in Frage kommen.*

	Wer hat Anspruch?	Wann sollte ich mich boostern lassen?	Kann ich eine zweite Auffrischung bekommen?	Mit welchem Impfstoff zur Auffrischung?
Wenn Sie ... erhalten haben Pfizer	Jeder im Alter ab 5 sollte sich boostern lassen, um auf dem Laufenden zu sein.	Mindestens 5 Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung mit dem Pfizer-Impfstoff.	Alle über 50-jährigen sollten mindestens 4 Monate nach Erhalt der 1. Auffrischung eine 2. Auffrischung erhalten.	Erwachsene ab 18 können eine Auffrischung mit jedem beliebigen mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 erhalten. Kinder im Alter von 5-17 sollten eine Auffrischung mit dem Pfizer-Impfstoff erhalten.
Wenn Sie ... erhalten haben Moderna	Erwachsene im Alter ab 18 sollten sich boostern lassen, um auf dem Laufenden zu sein.	Mindestens 5 Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung mit dem Moderna-Impfstoff.	Alle über 50-jährigen sollten mindestens 4 Monate nach Erhalt der 1. Auffrischung eine 2. Auffrischung erhalten.	Eine Auffrischung mit jedem beliebigen mRNA-Impfstoff gegen COVID-19.
Wenn Sie ... erhalten haben Johnson & Johnson	Erwachsene im Alter ab 18 sollten sich boostern lassen, um auf dem Laufenden zu sein.	Mindestens 2 Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung mit dem J&J-Impfstoff.	Alle über 50-jährigen und diejenigen, die den Impfstoff von J&J als Grundimmunisierung und Auffrischung erhalten haben, sollten mindestens 4 Monate nach Erhalt der 1. Auffrischung eine 2. Auffrischung erhalten.	Als 1. Auffrischung ist eine Auffrischung mit jedem beliebigen mRNA-Impfstoff dem Impfstoff von J&J vorzuziehen. Die 2. Auffrischung sollte mit einem beliebigen mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 erfolgen.
<i>Wenn Sie mäßig oder schwer immungeschwächt sind, gelten für Sie andere Richtlinien.</i>				

*Personen, die kürzlich eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, können überlegen, ob sie **ihre erste oder zweite COVID-19-Auffrischung um 3 Monate nach Symptombeginn oder positivem Test verschieben (wenn die Infektion ohne Symptome verlaufen ist)**. [Studien haben gezeigt](#) (nur auf Englisch), dass eine längere Zeit zwischen Infektion und Impfung zu einer verbesserten Immunantwort auf die Impfung führen kann. Außerdem wurde in den Wochen bis Monaten nach der Infektion ein geringes Risiko einer erneuten Infektion beobachtet. Individuelle Faktoren wie das Risiko einer [schweren COVID-19-Erkrankung](#) (nur auf Englisch), [die COVID-19-Lage auf gemeinschaftlicher Ebene](#) (nur auf Englisch) oder Merkmale des vorherrschenden SARS-CoV-2-Stamms sollten berücksichtigt werden, wenn entschieden wird, ob eine Auffrischung nach einer Infektion verschoben werden soll.

FAQs zu Auffrischimpfungen gegen COVID-19

Warum sind Auffrischimpfungen wichtig?

Auffrischimpfungen tragen dazu bei, einen anhaltenden Schutz gegen eine schwere Erkrankung zu bieten. Auffrischimpfungen wurden bisher nur für Bevölkerungsgruppen mit einem hohen Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf empfohlen, aber inzwischen wurde die Empfehlung ausgeweitet und umfasst nun alle Personen ab 5 Jahren, die eine Grundimmunisierung mit dem Pfizer-Impfstoff erhalten haben, um den Schutz vor einer COVID-19-Erkrankung zu erhöhen. Bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise Menschen mit mäßiger bis schwerer Immunschwäche, benötigen möglicherweise zusätzliche Dosen, um ihre Immunität zu erhöhen. Besonders wichtig ist dies angesichts des Auftretens immer ansteckenderer Varianten und der Zunahme von COVID-19-Fällen in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Wenn wir Auffrischimpfungen benötigen, bedeutet das dann, dass die Impfstoffe nicht richtig wirken?

Nein, die in den USA derzeit zur Verfügung stehenden COVID-19-Impfstoffe verringern wirksam das Risiko, schwer an Corona zu erkranken, deshalb im Krankenhaus behandelt werden zu müssen oder an der Corona-Erkrankung zu sterben, auch bei Ansteckung mit Varianten. Experten des öffentlichen Gesundheitswesens sehen jedoch einen verringerten Schutz vor leichten und mittelschweren COVID-19-Erkrankungen, insbesondere bei Hochrisikogruppen.

Was soll ich zu meinem Termin für die Auffrischimpfung mitbringen?

Bringen Sie bitte Ihren bzw. den Impfpass Ihres Kindes mit zu dem Auffrischimpftermin, damit zuvor geprüft werden kann, ob die Grundimmunisierung vollständig erfolgt ist. Wenn der Impfpass verloren gegangen ist, kann im Impfzentrum auch in Ihren Daten nachgesehen werden.

Was ist der Unterschied zwischen einer zusätzlichen Impfdosis und einer Auffrischung?

Eine zusätzliche Dosis ist für immungeschwächte Patienten vorgesehen, die eine 2-Dosen-mRNA-Impfstoffserie (Pfizer oder Moderna) erhalten, aber keine ausreichend starke Immunantwort entwickelt haben. Eine Auffrischimpfung wird verabreicht, um den Schutz und/oder die Immunität zu verstärken oder wiederherzustellen, nachdem der Schutz durch die ursprüngliche Impfstoffserie mit der Zeit nachgelassen hat.

Spielt die Marke des Impfstoffs für die Auffrischimpfung eine Rolle?

Sie können als Auffrischung einen anderen Impfstoff erhalten als den Impfstoff, den Sie als Grundimmunisierung erhalten haben, wenn Sie 18 Jahre oder älter sind. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Zentren für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) trafen ihre Entscheidung nach einer sorgfältigen Prüfung der neuesten Daten (Moderna, Johnson & Johnson, Kreuzimpfung als Auffrischung) und einer soliden und abwägenden Diskussion über Auffrischimpfungen. **Personen im Alter von 17 oder darunter dürfen nur den Impfstoff von Pfizer für die Auffrischung erhalten, wenn sie die Grundimmunisierung mit dem Pfizer-Impfstoff erhalten haben.**

Wann wird jemand als vollständig geimpft angesehen?

Sie sind bzw. Ihr Kind ist zwei Wochen nach Erhalt aller empfohlenen Dosen der Grundimmunisierung gegen COVID-19 **vollständig geimpft**.

Sie sind bzw. Ihr Kind ist mit der COVID-19-Impfung **auf dem Laufenden**, wenn alle Dosen der Grundimmunisierung und alle empfohlenen Auffrischimpfungen (nur auf Englisch), soweit diese für Sie in Frage kommen, verabreicht wurden.

Kann die Auffrischimpfung zusammen mit anderen Impfungen wie Gripeschutz verabreicht werden?

Ja. Sie können oder Ihr Kind kann gleichzeitig mit anderen Impfungen auch einen COVID-19-Impfstoff erhalten. Sie müssen sich für die erforderlichen Schulimpfungen (nur auf Englisch) oder andere empfohlene Impfungen Ihres Kindes und die COVID-19-Impfung keine getrennten Termine geben lassen. Ein Termin für eine COVID-19-Impfung ist eine gute Gelegenheit, alle empfohlenen Impfungen für Sie oder Ihr Kind auf den neuesten Stand zu bringen.

Noch fragen? Besuchen Sie:
doh.wa.gov/covidbooster

