

Guia de referência sobre as doses de reforço da vacina contra a COVID-19 para todas as idades



Você ou o seu filho foram vacinados com a série primária de uma vacina contra a COVID-19, para proteger a si mesmo e outras pessoas da forma grave da doença, hospitalização e até mesmo morte. Estudos demonstraram que, embora as vacinas contra a COVID-19 continuem a ser eficazes, elas podem diminuir sua proteção ao longo do tempo.

Agora, tomar a dose de reforço continua a ser a maneira mais eficaz de continuar protegido.

Confira a tabela abaixo para ver se você ou o seu filho são elegíveis para tomar uma ou mais doses de reforço de uma das vacinas contra a COVID-19.*

	Quem é elegível?	Quando devo receber a dose de reforço?	Posso receber uma segunda dose de reforço?	Qual vacina tomar na dose de reforço?
<p>Se você recebeu...</p> <p>Pfizer</p>	<p>Todas as pessoas com mais de 5 anos devem tomar a dose de reforço para ficarem em dia com a vacinação.</p>	<p>Pelo menos 5 meses após terem tomado a série primária da vacina da Pfizer.</p>	<p>Todas as pessoas com mais de 50 anos devem tomar uma 2ª dose de reforço pelo menos 4 meses depois de receber a 1ª dose de reforço.</p>	<p>Adultos com mais de 18 anos podem tomar uma dose de reforço de qualquer vacina de mRNA contra a COVID-19.</p> <p>Crianças entre 5 e 17 anos devem tomar uma dose de reforço da Pfizer.</p>
<p>Se você recebeu...</p> <p>Moderna</p>	<p>Adultos com mais de 18 anos devem tomar a dose de reforço para ficarem em dia com a vacinação.</p>	<p>Pelo menos 5 meses após terem tomado a série primária da vacina da Moderna.</p>	<p>Todas as pessoas com mais de 50 anos devem tomar uma 2ª dose de reforço pelo menos 4 meses depois de receber a 1ª dose de reforço.</p>	<p>Uma dose de reforço de qualquer vacina de mRNA contra a COVID-19.</p>
<p>Se você recebeu...</p> <p>Johnson & Johnson</p>	<p>Adultos com mais de 18 anos devem tomar a dose de reforço para ficarem em dia com a vacinação.</p>	<p>Pelo menos 2 meses após terem tomado a série primária da vacina da J&J.</p>	<p>Todas as pessoas com mais de 50 anos que tomaram uma vacina da J&J na série primária e na dose de reforço devem tomar uma 2ª dose de reforço pelo menos 4 meses depois de receber a 1ª dose de reforço.</p>	<p>Recomenda-se tomar uma dose de reforço de qualquer vacina de mRNA do que a vacina da J&J como 1ª dose de reforço. A 2ª dose de reforço deve ser de qualquer vacina de mRNA contra a COVID-19.</p>

Se você tem um grau de imunossupressão moderado ou grave, as recomendações poderão variar.

*As pessoas que tiveram infecção por SARS-Cov-2 recentemente podem considerar **adiar sua primeira ou segunda dose de reforço da vacina contra a COVID-19 por 3 meses a partir do início dos sintomas ou do teste positivo (caso a infecção tenha sido assintomática)**. [Estudos demonstraram](#) (somente em inglês) que o aumento do tempo entre a infecção e a vacinação pode resultar em uma melhor resposta imune à vacinação. Além disso, foi observado um baixo risco de reinfeção no período de semanas até alguns meses após a infecção. Fatores individuais, como o risco à [doença grave da COVID-19](#) (somente em inglês), [nível de COVID-19 dentro da comunidade](#) (somente em inglês) ou características da cepa predominante de SARS-Cov-2 devem ser levados em consideração ao determinar o adiamento da dose de reforço após a infecção.

Perguntas frequentes sobre as doses de reforço da vacina contra a COVID-19

Por que as doses de reforço são importantes?

As doses de reforço ajudam a proteger continuamente contra a forma grave da doença. As doses de reforço foram previamente recomendadas às pessoas com alto risco de desenvolver a forma grave da COVID-19, mas agora a recomendação se tornou mais ampla, incluindo indivíduos com 5 anos de idade ou mais, que receberam a série primária da Pfizer, a fim de aumentar a proteção contra a doença da COVID-19. Certos grupos populacionais, tais como as pessoas que têm um grau moderado ou severo de imunossupressão, podem precisar de doses adicionais para aumentar a imunidade. Isto é muito importante, principalmente por causa do surgimento de outras variantes contagiosas e do aumento de casos de COVID-19 nos Estados Unidos.

O fato de precisarmos de doses de reforço significa que as vacinas não estão sendo eficazes?

Não. As vacinas atuais contra a COVID-19 existentes nos Estados Unidos são muito eficazes para prevenir a forma grave da doença, a hospitalização e a morte, até mesmo contra as variantes. Porém, os especialistas em saúde pública estão observando uma redução na proteção contra a forma leve e moderada da COVID-19, especialmente entre a população de alto risco.

O que devo levar ao local de vacinação quando for tomar uma dose de reforço?

Leve o seu cartão de vacinação, ou o do seu filho, ao local de vacinação para tomar a dose de reforço, assim o provedor poderá confirmar se a série primária de vacinas foi administrada. Se o cartão foi perdido, o provedor poderá consultar seu registro.

Qual é a diferença entre uma dose adicional e uma dose de reforço da vacina?

A dose adicional é para pacientes imunossuprimidos que completaram uma série de 2 doses de vacinas de mRNA (Pfizer ou Moderna), mas não tiveram uma resposta imunológica suficientemente forte.

A dose de reforço serve para aumentar ou restaurar a proteção após uma provável diminuição na imunidade ao longo do tempo.

A marca da vacina é importante para a dose de reforço?

Você pode receber uma vacina diferente da que você recebeu na série primária em sua dose de reforço se você tem mais de 18 anos de idade. Após uma discussão sólida e definitiva em torno das doses de reforço, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças) tomou a decisão fazendo uma cuidadosa revisão dos últimos dados (Moderna, Johnson & Johnson, misturas e combinações das doses de reforço). **Pessoas com até 17 anos de idade podem receber apenas a vacina da Pfizer na dose de reforço, se tiverem tomado a vacina da Pfizer na série primária.**

Quando uma pessoa é considerada totalmente vacinada?

Você ou seu filho estão **completamente vacinados** duas semanas após receber todas as doses recomendadas da primeira série da vacinação contra a COVID-19.

Você ou seu filho estão **em dia** com a vacinação contra a COVID-19 ao receberem todas as doses da primeira série e todas as doses de reforço recomendadas (somente em inglês), quando elegível.

A dose de reforço pode ser tomada com outras vacinas, como a da gripe?

Sim. Você ou o seu filho podem ser vacinados contra a COVID-19 ao mesmo tempo em que recebe outras vacinas. Você não precisa agendar as vacinas escolares obrigatórias (somente em inglês) do seu filho, ou outras vacinas recomendadas, para serem tomadas separadamente da vacinação contra a COVID-19. Um agendamento para a vacinação contra a COVID-19 é mais uma oportunidade para que você ou o seu filho fiquem em dia com todas as vacinas recomendadas.

Tem outras dúvidas? Acesse: doh.wa.gov/covidbooster

