


유증상자가 발생할 경우 해야 할 일



다음 플로우차트는 K-12 학교, 보육시설 및 연계된 교과 외 활동을 위한 것입니다.

다음 증상 중 한 가지 이상이 있는 경우

- 발열($\geq 100.4^{\circ}\text{F}/38^{\circ}\text{C}$) 또는 오한
- 숨가쁨 또는 호흡 곤란
- 근육통 또는 몸살
- 새로운 미각 또는 후각 상실
- 기침(새로 나타남, 양상 변화 또는 악화)
- 메스꺼움, 구토 또는 설사
- 피로감
- 인후통
- 코막힘 또는 콧물



자택에서 확진격리 및 COVID-19 검사 받기

증상이 진단을 받은 만성 질환
증상과 일치하지 않는 경우
또는 의료서비스 제공자로부터 대체
진단을 받지 못한 경우
또는 검사를 받지 않은 경우

COVID-19 양성
판정을 받은 경우

COVID-19 음성
판정을 받은 경우

자택에서 확진격리

다음의 경우 증상이 최초로 발현된 후 5일이 경과하면
학교, 보육시설 및 활동으로 복귀 가능

1. 지난 24시간 동안 발열 증세가 없음(약을 복용하지 않은 상태에서) 및
2. 증상이 상당히 호전됨

추가적으로, 6-10일차까지 다른 사람 주변에 있을 때
마스크를 착용해야 합니다.**

다음의 경우 학교, 보육시설 및 활동으로 복귀

1. 지난 24시간 동안 발열 증세가 없음(약을 복용하지 않은 상태에서)

그리고

2. 증상이 상당히 호전됨

증상이 지속되면 증상이 시작된 후 최소 5일 동안
24~48시간마다 재검사하십시오.

보육 서비스 제공자는 Washington Administrative Code(WAC, 워싱턴 행정법)
및 인허가 요건을 검토하고 필요한 추가 조치를 따라야 합니다.



DOH 820-229 August 4, 2022 Korean 본 문서를 다른
형식으로 요청하려면 1-800-525-0127로 전화하십시오.
청각 장애가 있는 고객은 전화 711(Washington Relay) 또는
이메일 civil.rights@doh.wa.gov로 연락하시면 됩니다.

* 아동이 2세 미만이고 다른 증상 없이 코막힘/콧물 증상만 있을 경우에는 검사 및 격리는 필요 없습니다. 아동의 증상이 악화되거나 5일 이상 지속되는 경우 2세 이상 아동용 플로우차트를 따르고 의료 서비스 제공자에게 연락하는 것이 좋습니다.

** 얼굴에 꼭 맞는 마스크를 착용할 수 없는 경우: 자택에서 10일 내내 확진격리를 완료해야 합니다. 추가 정보는 [K-12/아동 관리 지침](#)을 확인하시기 바랍니다.

노출 알리를 받거나 COVID-19에 노출되었다고 생각되는 경우 해야 할 일



다음 플로우차트는 K-12 학교, 보육시설 및 연계된 교과 외 활동을 위한 것입니다.

**백신접종 여부에 관계없이,
다음 지침을 따름:**

- 학교, 보육시설 및 활동에 계속해서 참여
- 노출 후 10일간 증상 관찰하기
- 노출 후 가능한 한 신속히 검사받기
- 노출 후 10일간 얼굴에 꼭 맞는 마스크 착용하기

