



THÔNG TIN NHANH: VẮC-XIN NGỪA COVID-19 VÀ THAI KỲ

Có rất nhiều thông tin sai lệch ngoài kia về vắc-xin ngừa COVID-19 và thai kỳ. Hãy cùng giải đáp một số thông tin đã biết!

Vắc-xin ngừa COVID-19 là an toàn để sử dụng trước, trong và sau khi mang thai.

Việc tiêm phòng khi mang thai được khuyến cáo bởi American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, Trường Cao Đẳng Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ) và Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) để bảo vệ chống lại bệnh COVID-19 nghiêm trọng.

Những người đang mang thai có nguy cơ cao bị bệnh nặng và gặp biến chứng nếu họ phát triển COVID-19.

Bị bệnh nặng với COVID-19 trong hoặc sau khi mang thai có thể làm tăng đáng kể nguy cơ nhập viện cần thở máy, các biến chứng khi mang thai, sinh non hoặc thai chết lưu.

Không có bằng chứng nào cho thấy vắc-xin ngừa COVID-19 gây dị tật bẩm sinh, sẩy thai, sinh non, thai chết lưu hoặc các biến chứng khác.

Tuy nhiên, bệnh COVID-19 đã được biết là gây ra những biến chứng này.

Việc tiêm phòng là an toàn nếu quý vị đang cho con bú.

Sữa mẹ có thể truyền các kháng thể cho con để giúp bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm COVID-19 cho đến khi trẻ đủ điều kiện tiêm chủng lúc 6 tháng tuổi.

Nguồn trợ giúp:

Vắc-xin ngừa COVID-19 Khi Đang Mang Thai hoặc Cho Con Bú (cdc.gov) | <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html> (Chỉ có bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hàn, Tiếng Việt và Tiếng Trung)

Những Người Mang Thai và Gần Đây Đang Mang Thai | CDC | <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html> (Chỉ có bằng Tiếng Anh)

Vắc-xin Ngừa COVID-19 và Thai Kỳ: Những Điều Cần Biết | Johns Hopkins Medicine | <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/the-covid19-vaccine-and-pregnancy-what-you-need-to-know> (Chỉ có bằng Tiếng Anh)