

چارت واکسین های ضروری بخاطر مراقبت از طفل برای والدین



راهنمای ها: برای اینکه ببینید کدام واکسین برای مراقبت طفل ضروری است، سن طفل خود را پیدا کنید و برای یافتن واکسین ها و دوزهای مورد نیاز به آن ردیف ببینید. اطفال باید حداقل فواصل و سن واکسین را داشته باشند تا شرایط لازم را برآورده کنند. لطفاً اگر سوالی دارید با ارائه دهنده مراقبت های صحتی یا ارائه دهنده مراقبت از طفل خود صحبت نمایید.

هپتاییتس B	اسهال، تیتانوس، سیاه سرفه	هیب/انفلونزای هموفیلوس نوع B	پولیو	کنژوگه نیوموکوکل	سرخکان، گوشک، روبیلا	واریسلا (آبله مرغان)
(Hepatitis B)	(DTaP)	(HIB)	(Polio)	(PCV)	(MMR)	(Varicella)
در 3 ماهگی	دوز 1	دوز 1	دوز 1	دوز 1	به طور معمول قبل از 12 ماهگی داده نمی شود	به طور معمول قبل از 12 ماهگی داده نمی شود
در 5 ماهگی	دوز 2	دوز 2	دوز 2	دوز 2		
در 7 ماهگی	دوز 2	دوز 3	دوز 2	دوز 3		
16 ماهگی	دوز 2	دوز 3	دوز 4	دوز 2	دوز 1	دوز 1**
در 19 ماهگی	دوز 3	دوز 4	دوز 4	دوز 3	دوز 1	دوز 1**
در 7 سالگی یا دوره قبل از مکتب/ورود به مکتب در < 4 سالگی***	دوز 3	دوز 5*	به طور معمول به اطفال 5 ساله و بالاتر داده نمی شود	4 دوز*	دوز 2	دوز 2**

*ممکن است دوزهای واکسین با کمتر از مقدار ذکر شده قابل قبول باشد، نظر به زمان تزریق آنها. ** تأیید سابقه مرض آبله مرغان توسط ارائه دهنده مراقبت های صحتی نیز قابل قبول است. ***اطفالی که در صنف قبل از دوره مکتب- صنف 12ام می روند باید شرایط واکسیناسیون را برای صنف خود در مکتب داشته باشند.

چارت شرایط قبل از دوره مکتب- صنف 12ام و منابع اضافی واکسیناسیون را می توان در این آدرس یافت میشود: www.doh.wa.gov/SCCI
 معلومات مربوط به سایر واکسین های مهم که برای حضور مراقبت طفل نیاز نیستند را در این آدرس بیابید: www.immunize.org/cdc/schedules

برای درخواست این سند در فارمت دیگر، با شماره 1-800-525-0127 در تماس شوید.