

Impfung gegen COVID-19



Der Kampf gegen die Pandemie ist hart, aber jetzt haben wir Impfstoffe, die uns vor COVID-19 schützen.



Der Impfstoff wird Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Kosten für Ihre Impfung werden von der Landesregierung übernommen. Möglicherweise erheben die Anbieter eine Gebühr für die Verabreichung des Impfstoffs, aber diese wird höchstwahrscheinlich von der Krankenversicherung übernommen. Die Anbieter verzichten auf die Gebühr, wenn Sie sich diese nicht leisten können.



Fragen Sie, wie viele Dosen Sie benötigen.

Je nachdem, welchen Impfstoff Sie erhalten, benötigen Sie möglicherweise zwischen 1 und 3 Dosen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, wie viele Dosen Sie oder Ihr Kind möglicherweise benötigen. Möglicherweise benötigen Sie oder Ihr Kind 2–6 Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung auch eine Auffrischimpfung.



Die Impfstoffe sind sicher und wirksam.

Alle Impfstoffe sind von der U.S. Food and Drug Administration (FDA, US-amerikanische Arzneimittelbehörde) entweder vollständig zugelassen oder für den Notfall zugelassen, was bedeutet, dass die FDA keine ernsthaften Sicherheitsbedenken festgestellt hat.



Jede Person ab einem Alter von 6 Monaten kann die Impfung erhalten.

Der COVID-19-Impfstoff steht allen Menschen ab einem Alter von 6 Monaten zur Verfügung. Besuchen Sie [VaccineLocator.doh.wa.gov](https://www.vaccineLocator.doh.wa.gov), um einen Termin zu finden und zu vereinbaren. Sie können auch 1-800-525-0127 anrufen und dann # drücken. Geben Sie für Dolmetscherdienste Ihre Sprache an, wenn den Sie den Anruf entgegennehmen.



Bei Ihnen können Nebenwirkungen auftreten.

Wie auch bei anderen Routine-Impfungen kann es nach Verabreichung des Impfstoffs zu Schmerzen im Arm, Fieber, Kopfschmerzen oder Müdigkeit kommen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Impfstoff wirkt.



Erhalten Sie Ihre Sicherheit aufrecht.

Tragen Sie nach Erhalt des Impfstoffs Ihre Maske, halten Sie einen Abstand von zwei Metern voneinander und halten Sie Versammlungen im kleinen Rahmen.

Fragen? Besuchen Sie: www.CovidVaccineWA.org

Impfung gegen COVID-19

Welche Impfstoffe stehen zur Verfügung?

Es sind vier Impfstoffe verfügbar – Pfizer, Moderna, Novavax und Johnson & Johnson.

Alle haben von der FDA eine Notfallzulassung erhalten. Medizinische Experten des Advisory Committee for Immunization Practices (Beratender Ausschuss für Immunisierungspraktiken) und der Western States Scientific Safety Review Workgroup (Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für Sicherheitsüberprüfungen der Weststaaten) haben bestätigt, dass die Impfstoffe unseren Sicherheitsstandards entsprechen.

Wer sollte eine COVID-19-Impfung erhalten?

Es ist Ihnen überlassen, ob Sie sich impfen lassen. Wenn Sie sich für die Impfung entscheiden, informieren Sie Ihr Impfteam bitte, wenn Sie:

- in der Vergangenheit schwere allergische Reaktionen hatten
- Fieber haben
- eine Blutungsstörung haben oder Blutverdünner nehmen
- immungeschwächt sind oder ein Arzneimittel einnehmen, das Ihr Immunsystem beeinträchtigt
- schwanger sind, planen, schwanger zu werden oder gerade stillen
- einen anderen COVID-19-Impfstoff erhalten haben

Sie sollten den Impfstoff nicht erhalten, wenn Sie eine schwerwiegende allergische Reaktion auf eine frühere Dosis des COVID-19-Impfstoffs oder auf einen Bestandteil des Impfstoffs hatten.

Die Impfstoffe enthalten den Wirkstoff sowie Fett, Salze und Zucker, um den Impfstoff zu schützen und sein Wirken im Körper zu verbessern.

Sie müssen mindestens 6 Monate alt sein, um den Pfizer-BioNTech- oder den Moderna-Impfstoff zu erhalten, 12 Jahre um den Novavax-Impfstoff zu erhalten und 18 Jahre, um den Impfstoff von Johnson & Johnson zu erhalten.

Was sind die Nebenwirkungen?

Es kommt häufig vor, dass ein bis drei Tage nach Erhalt des Impfstoffs Nebenwirkungen auftreten. Häufige Nebenwirkungen sind Müdigkeit, Muskelschmerzen, Schmerzen in Ihrem Arm, wo Sie Ihre Spritze bekommen haben, Fieber, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit oder Erbrechen. Wenn Ihre Symptome nicht vorübergehen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Klinik.

Sie sollten 15 bis 30 Minuten warten, bevor Sie das Impfzentrum verlassen, damit Ihr Impfteam Ihnen helfen kann, wenn Sie eine allergische Reaktion oder andere Nebenwirkungen haben. Während Sie warten, können Sie sich bei v-safe anmelden, um Nebenwirkungen zu melden: v-safe.cdc.gov (nur auf Englisch verfügbar).

Sie oder Ihr Impfstoffanbieter können Nebenwirkungen auch an das Berichtssystem für Impfnebenwirkungen (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) melden: vaers.hhs.gov/reportevent.html (nur auf Englisch verfügbar).

Rufen Sie 911 an, wenn Sie nach Verlassen der Klinik eine allergische Reaktion haben.

Anzeichen einer allergischen Reaktion sind: Atembeschwerden, Schwellung von Gesicht und Hals, schneller Herzschlag, ein starker Ausschlag am ganzen Körper, Schwindel und Schwäche.

Was passiert, nachdem ich geimpft wurde?

Wenn Sie oder Ihr Kind einen Impfstoff erhalten haben, der in zwei oder drei Dosen verabreicht wird, vereinbaren Sie einen Termin für Ihre nächste(n) Dosis/Dosen. Sie müssen in 3–8 Wochen wiederkommen, um Ihre nächste(n) Dosis/Dosen zu erhalten.

Weitere Informationen zum Impfkalendar erhalten Sie unter doh.wa.gov/covidbooster.

Es dauert bis zu zwei Wochen, nachdem die Impfung abgeschlossen ist, bis Sie einen maximalen Schutz genießen. Es wird außerdem empfohlen, sich nach zwei bis sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung geben zu lassen, um Ihren Schutz aufrechtzuerhalten.



DOH 348-782 December 2022 - German

Um dieses Dokument in einem anderen Format zu erhalten, rufen Sie bitte 1-800-525-0127 an. Gehörlose oder schwerhörige Kunden rufen bitte 711 (Washington Relay) an oder senden eine E-Mail an civil.rights@doh.wa.gov.