

# 코로나19 예방 접종 받기



대유행으로 힘든 시기를 보냈습니다. 이제 코로나19로부터 우리를 보호할 두 가지 예방 접종이 출시되었습니다.



## 예방 접종은 무료로 제공됩니다.

연방 정부가 예방 접종 비용을 부담합니다. 서비스 제공자가 예방 접종 비용을 부과할 수 있지만, 건강 보험으로 보장받을 것입니다. 비용을 감당할 수 없는 경우, 공급자가 비용을 면제할 것입니다.



## 몇 번 맞아야 하는지 문의하십시오.

접종하는 백신 종류에 따라 1-3차 접종이 필요할 수 있습니다. 귀하 또는 자녀에게 필요한 접종 차수에 대해 의료 제공자에게 문의하십시오. 귀하 또는 자녀는 기본 시리즈 접종 완료 후 2~6개월 경과 시 부스터샷이 필요할 수도 있습니다.



## 예방 접종은 안전하고 효과적입니다.

U.S. Food and Drug Administration (FDA, 미국 식품의약국) 이 모든 백신에 대해 정식 사용을 승인했거나 긴급 사용을 승인했다는 것은 FDA가 심각한 안전 문제를 발견하지 못했다는 뜻입니다.



## 생후 6개월 이상이면 누구나 백신을 맞을 수 있습니다.

COVID-19 백신은 생후 6개월 이상 누구나 맞을 수 있습니다. [VaccineLocator.doh.wa.gov](https://www.vaccineLocator.doh.wa.gov)를 방문하여 일정을 찾아 예약하십시오. 1-800-525-0127로 전화하여 #을 눌러도 됩니다. 통역 서비스의 경우, 전화가 연결되었을 때 귀하의 언어를 말하십시오.



## 부작용을 느낄 수 있습니다.

다른 정기 예방 접종과 마찬가지로, 예방 접종을 받은 후 팔 통증, 발열, 두통 또는 피로를 느낄 수 있습니다. 이는 예방 접종이 효과가 있다는 징후입니다.



## 안전하게 지내세요.

예방 접종을 받은 후 마스크를 쓰고, 2미터 간격을 유지하고, 모임을 작게 하세요.

질문이 있으신가요? [www.CovidVaccineWA.org](https://www.CovidVaccineWA.org)를 방문하세요.

# 코로나19 예방 접종 받기

## 어떤 예방 접종이 있나요?

Pfizer, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson 등 4가지 백신을 이용할 수 있습니다.

U.S. Food and Drug Administration (FDA, 미국 식품의약국) 이 모든 백신에 대해 정식 사용을 승인했거나 긴급 사용을 승인했다는 것은 FDA가 심각한 안전 문제를 발견하지 못했다는 뜻입니다.

## 누가 코로나19 예방 접종을 받아야 하나요?

예방 접종을 받는 것은 개인의 선택입니다. 예방 접종을 받기로 한 경우, 다음 사항을 예방 접종 제공자에게 알려야 합니다.

- 심한 알레르기 반응의 병력이 있음
- 열이 있음
- 출혈 장애가 있거나 혈액 희석제 복용 중
- 면역력이 저하되었거나 면역 체계에 영향을 미치는 약을 복용 중
- 임신 중이거나 임신 계획이 있거나 수유 중
- 다른 코로나19 예방 접종을 받았음

이전에 받은 코로나19 예방 접종이나 예방 접종의 성분에 심각한 알레르기 반응을 보인 적이 있다면 예방 접종을 받으면 안 됩니다.

백신에는 활성 성분과 더불어 지방, 염분, 당이 포함되어 백신을 보호하고 체내에서 효과적으로 작동하도록 돕습니다.

Pfizer-BioNTech 또는 Moderna 백신을 접종하려면 최소 생후 6개월, Novavax 백신을 접종하려면 12세 이상, Johnson & Johnson 백신을 접종하려면 18세 이상이어야 합니다.

## 어떤 부작용이 있을까요?

예방 접종을 받은 후 1~3일 후에 부작용이 발생하는 것은 일반적인 일입니다. 일반적인 부작용은 피로, 근육통, 주사를 맞은 팔의 통증, 발열, 두통, 관절통, 오한, 메스꺼움 또는 구토입니다. 증상이 사라지지 않으면 의사나 진료소에 문의하시기 바랍니다.

예방 접종 장소를 떠나기 전에 15분에서 30분 정도 기다려 알레르기 반응이나 기타 부작용이 나타나는 경우 예방 접종 제공자가 도울 수 있도록 하세요. 기다리는 동안 v-safe에 가입하여 부작용을 보고하세요:

<http://vsafe.cdc.gov/ko/>.

귀하 또는 귀하의 예방 접종 제공자는 Vaccine Adverse Event Reporting System(VAERS, 예방 접종 이상 반응 보고 시스템)에 부작용을 보고할 수도 있습니다:

[vaers.hhs.gov/reportevent.html](http://vaers.hhs.gov/reportevent.html)(영어로만 제공).

**진료소를 떠난 후 알레르기 반응이 나타나면 911에 전화하세요.** 알레르기 반응의 징후로는 호흡 곤란, 얼굴과 목의 부기, 빠른 심장 박동, 전신 발진, 현기증, 힘 없음이 있습니다.

## 예방 접종을 받은 후 다음 단계는 무엇인가요?

귀하 또는 자녀가 2차 또는 3차 접종을 받은 경우 다음 접종을 예약하십시오. 다음 백신 접종을 받으려면 3~8주 후에 다시 방문해야 합니다.

백신 일정에 대한 자세한 정보는

[doh.wa.gov/covidbooster](http://doh.wa.gov/covidbooster)를 참조하십시오.

접종 후 최대 2주가 지나야 완전히 보호됩니다. 또한 예방 효과를 유지하기 위해 2~6개월 이내에 부스터샷 접종을 받을 것을 권장합니다.



DOH 348-782 December 2022 Korean

본 문서를 다른 형식으로 요청하려면 1-800-525-0127번으로 전화해 주세요. 청각 또는 난청 장애 고객의 경우, 전화 711(Washington Relay) 또는 이메일([civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov))을 이용하시기 바랍니다.