

د کووید 19 واکسین ترلاسه کول

Vaccinate
WA
CovidVaccineWA.org

د وبا پر وړاندې مبارزه ستونزمنه شوي ده، مگر مور او اوس واکسین لرو چې خپل ځان له کووید 19 څخه خوندي کړو.



واکسین ستاسو له پاره په وړیا ډول چمتو کيږي.

ستاسو د واکسین لگښت به د فدرال دولت ورکړي. له تاسو څخه باید لگښت وا نخیستل شي او نه باید بل درکړل شي. که تاسو د خپل چمتو کونکي دفتر ته یواځې د دې له پاره ورځئ چې واکسین ترلاسه کړئ نو هغوی باید له تاسو څخه لگښت وانخلي.



پوښتنه وکړئ چې تاسو څو ډوزونو ته اړتیا لرئ.

دې ته په پام سره چې تاسو کوم واکسین ترلاسه کوئ، کیدای شي له 1 څخه تر 3 ډوزونو ته اړتیا وي. د دې په اړه چې تاسو یا ماشوم مو کیدای شي څو ډوزونو ته اړتیا ولري له خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ. کیدای شي تاسو او ماشوم مو د لومړنۍ لړۍ له بشپړولو څخه له 2 تر 6 میاشتو وروسته تقویه کونکي ډوز ته اړتیا ولرئ.



واکسینونه خوندي او اغېزناک دي.

واکسینونه پر کووید 19 ناروغی د اخته کېدو په مخنیوي کې خورا اغېزناک دي. ټول واکسینونه U.S. Food and Drug Administration (FDA) او سازمان غذا و داروی آمریکا له لوري یا په بشپړه توګه تایید یا بېرني کاروني لپاره جواز ترلاسه کړی – دا په دې معنی ده چې FDA د خونديتوب هېڅ کومه جدي اندېښنه په کې نه ده موندل شوې.



هر څوک چې عمر یې 6 کاله او یا تر هغې لور وي کولای شي واکسین ترلاسه کړي.

د COVID-19 واکسین ټولو هغو خلکو ته چې عمر یې 6 کاله او یا تر هغې لور وي د لاسرسۍ وړ دی. د مهالوپش او د لیدنې د وخت د ټاکلو له پاره [VaccineLocator.doh.wa.gov](https://www.vaccineLocator.doh.wa.gov) ته مراجعه وکړئ. همدارنګه تاسو کولای شئ له 1-800-525-0127 سره اړیکه ونیسئ، بیا د # تڼۍ کېکارئ. کله چې ستاسو اړیکې ته ځواب ورکړل شو، د ژباړې د خدمتونو له پاره خپله ژبه ووايئ.



بڼایي تاسو جاني عوارض احساس کړئ.

د واکسین کولو وروسته به تاسو د نورو عادي واکسینونو په څېر په خپل مټ یو ټپ ولرئ، تبه، سردرد او ستړیا به درته پیدا شي. دا د دې نښې دي چې واکسین کار کوي.

خوندي پاتې شئ.

کله مو چې واکسین ترلاسه کړ، ماسک واغونډئ، له نورو څخه شپږ فوټه (دوه متره) واټن وساتئ او په سترو غونډو کې ګډون مه کوئ.



پوښتنې؟ www.CovidVaccineWA.org ته مراجعه وکړئ

د کووید 19 واکسین ترلاسه کول

جانبی عوارض څه دي؟

له واکسین اخیستو څخه وروسته د یوې یا درې ورځو له پاره په معمول ډول جانبی عوارض موجود وي. عام جانبی عوارض یې ستړیا، د عضلاتو درد، د واکسین په ځای کې د درد احساس، تبه، سر درد، د مفصلونو درد، لږزه، زړه بدوالی او کانګې دي. که تاسو دا نښې لرئ، لږې مه ځئ او له خپل ډاکټر یا کلینیک سره اړیکه ونیسئ.

د واکسین ترلاسه کولو وروسته د 15 یا 30 دقیقو له پاره د واکسین په ځای کې پاتې شئ، ځکه که چېرته تاسو د واکسین پر وړاندې حساسیت یا نور جانبی عوارض وښیئ نو ستاسو د واکسین چمتو کوونکی به له تاسو سره مرسته وکړي. تاسو د انتظار پر مهال کولای شئ په v-safe کې نوملیکنه وکړئ تر څو د جانبی عوارضو په اړه خبر ورکړئ: vsafe.cdc.gov.

همدارنگه تاسو او یا ستاسو د واکسین چمتو کوونکی کولای شئ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)، د واکسین پر ضد پېښې د راپور ورکولو سیستم): vaers.hhs.gov/reportevent.html ته د جانبی عوارضو په اړه راپور ورکړي.

که له کلینیک څخه تر وتلو وروسته تاسو ته جانبی عوارض پیدا شوي وي نو له 911 شمېرې سره اړیکه ونیسئ. د حساسیتي غبرګون په نښو کې دغه نښې شاملې دي: په سختی سره نفس اخیستل، د مخ او ستوني پړسوب، د زړه چټک ضربان، د ټول وجود نا آرامي، د سر څرخېدل او کمزوري.

کله چې زه واکسین ترلاسه کړم څه به کېږي؟

که چېرې تاسو او یا ماشوم مو د واکسین دوه یا درې ډوزونه ترلاسه کړي وي، د خپل راتلونکی (دویم) ډوزونو (لپاره د لیدني یو وخت تنظیم کړئ. د خپل بل ډوز د ترلاسه کولو لپاره تاسو باید له 3-8 اونیو وروسته د بل ډوز) ډوزونو (لپاره مراجعه وکړئ. د واکسین د مهالویش په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره doh.wa.gov/covidbooster ته مراجعه وکړئ.

کله چې تاسو په بشپړ ډول واکسین ترلاسه کړئ نو دوه اونۍ وروسته به تاسو د خونديتوب لورې کچې ته ورسېږئ. ستاسو د خونديتوب د دوام لپاره د دې سپارښت هم کېږي چې له دوو څخه تر شپږو میاشتو په موده کې د تقویمي ډوز ترلاسه کړئ.

کوم واکسینونه د لاسرسي وړ دي؟

دلته څلور ډوله واکسینونه شتون لري - Pfizer, Moderna, Novavax او Johnson & Johnson.

ټول واکسینونه U.S. Food and Drug Administration (FDA)، سازمان غذا و داروی امریکا له لوري یا په بشپړه توګه تایید یا بېرني کارونې لپاره جواز ترلاسه کړی - دا په دې معنی ده چې FDA د خونديتوب هېڅ کومه جدي اندېښنه په کې نه ده موندل شوې.

څوک باید د کووید 19 واکسین ترلاسه کړي؟

تاسو په واکسین کولو کې اختیار لرئ. که تاسو تصمیم ونیو چې واکسین وکړئ، نو خپل د واکسین چمتو کوونکی ته ووايئ:

- که د سختو حساسیتي غبرګونونو مخینه لرئ
 - تبه لرئ
 - د وینې بهیدني بې نظمي لرئ او یا د وینې نري کونکي خورئ
 - که تاسو داسې درمل خورئ چې هغه ستاسو د مدافعي پر سیستم اغېز لري
 - چې مېندواري یاست، پلان لرئ چې مېندواري شئ او یا ماشوم ته شیدې ورکوئ
 - د کووید 19 کوم بل واکسین مو ترلاسه کړی وي
- که تاسو د کووید 19 واکسین مخکیني ډوز او د واکسین نورو عناصرو ته جدي حساسیت ښودلی وي، نو تاسو باید واکسین ونکړئ.

واکسینونه له غوړو، قندو او مالګې سره د فعالې مادې لرونکي دي، تر څو له واکسینونو څخه ساتنه وکړي او په بدن کې په بڼه ډول د هغوی له اغیز سره مرسته وکړي.

تاسو باید لږ تر لږه 6 میاشتې او یا له هغې څخه زیات عمر ولرئ تر څو Pfizer-BioNTech او Moderna یا Moderna او یا له هغې څخه زیات عمر ولرئ چې Novavax او 18 کاله یا له هغې څخه زیات عمر ولرئ چې Johnson & Johnson واکسین ترلاسه کړي.

DOH 348-782 November 2022 Pashto



د دې سند په بله بڼه کې د غوښتنې کولو لپاره، 1-800-525-0127 ته زنگ ووهئ. کانه او هغه پېرودونکي چې د اورېدو ستونزه لري، لطفاً 711 (Washington Relay) سره اړیکه ونیسئ او یا civil.rights@doh.wa.gov ته برېښنالیک ور واستوي.