


Intérpretación al español

Para obtener acceso a la interpretación en español en Zoom: Haga clic en el icono de “Interpretation” en la barra de herramientas. Luego, haga clic en Spanish (español). Esto le conectará a la interpretación en español.




¿PREGUNTAS?

Por favor, envíe un mensaje a Bella Méndez, si tiene alguna pregunta

English Interpreter

To access English interpretation on Zoom: Click the “Interpretation” icon on the toolbar. Then click on English. This will connect you to the English interpretation. If you are not bilingual, please click on the English interpretation. You will still hear the English when spoken, and the interpretation in English when Spanish is spoken.



QUESTIONS?

Please message Bella Mendez
If you have any questions!



VACCINE COLLABORATIVE: LATINO PARTNER SPACE

August 18th, 2022



Bella Mendez

Gender Pronouns: She/Ella

Equity & Social Justice Strategist- Latino/a/x Community

360-481-9154

Bella.mendez@doh.wa.gov

Washington State Department of Health

Workgroup Meeting Agenda

- Introductions in chat
- Group norms check-in
- Community Partner agenda items
- Review and provide feedback on infographics and messaging

Introductions

Please share, in the chat or verbally, the following:

- Name, preferred pronoun
- Access Needs
- Organization
- Please share how you currently serve the Latino community
- Visual description

Group Norms

-
- Be accountable for your impact (vs. your intention)
 - Move up, move back
 - Notice your own defensive reactions and attempt to use these reactions as entry points for gaining deeper self-knowledge, rather than as a rationale for closing off.
 - Recognize how your own social positionality (e.g., race, class, gender, sexuality, ability) informs your perspectives and reactions to your colleagues and facilitators
 - Acknowledge power differences between DOH employees and group participants.
 - Accept and expect non-closure
 - Ask about access needs

Community Partner Agenda Items

Please feel free to share verbally or in the chat

- Events
- Resources
- Emerging needs/items you would like to flag for DOH





DOH Updates

Update regarding question on
outreach to Latinx community
on Moneypox



Review and Work Overview

Review

- Objective #1:
 - Created data infographics that reflect the Latinx/Latino community that are simple to understand to share with community members
 - Next step: transcreation and translation



Workgroup goals/objectives to work on together

- 1) Create data infographics that reflect the Latinx/Latino community that are simple to understand to share with community members
 - Using WA DOH Dashboard for easily sharing or demonstrating to Latinx/Latino community what is currently happening with COVID-19 cases, vaccines, boosters etc.
- 2) Create COVID-19 messaging for late summer/early fall in Spanish and Indigenous languages that can easily be shared in audio
 - For example: podcast and radio
- 3) Work on consent form for youth specifically tailored for the Hispanic community, youth and families
 - Help youth understand rights to accessing medical services/vaccine and educating parents on why this exists in a culturally appropriate way
 - Look into utilizing TicToc to reach younger age, population, and youth
- 4) Create directory of interpreters/translators for Indigenous languages of Latin America that are spoken in Washington state.

Review

- Objective #1:
 - Created data infographics that reflect the Latinx/Latino community that are simple to understand to share with community members
 - Next step: transcreation and translation

Only 55.6% of the Latina community has completed the *primary series of the COVID-19 vaccine




69.0%
Statewide




55.6%
Hispanic

*Primary series is defined as two doses of Moderna or Pfizer and one dose of Johnson and Johnson



The **Latino community** is behind on receiving the primary series of the COVID-19 Vaccine compared to the **general population**




The Latino **5-11 age group** is behind the state average for receiving the primary series of the COVID-19 Vaccine



The Latinx **25-34 age group** is behind the state average for COVID-19 vaccination series





COVID-19 Deaths by Vaccination Status in Ages 5+ Years

April 4, 2021 – May 28, 2022
(30 U.S. jurisdictions)

124,000
Unvaccinated Deaths

Unvaccinated people
aged 5 years and older
are **6 times** more at risk of
dying from COVID-19
in May 2022

Did you know...
people who are
unvaccinated are
2.8 times more
likely to get
COVID-19


Updated August 2022



(CDC Data from June 2022, people ages 5+, as compared to people vaccinated with at least a primary series)




COVID-19 case rates by race/ethnicity in Washington per 100,000 for the week of June 25th, 2022



Rates of COVID-19 Death by Vaccination Status

Data as of May 28, 2022 (30 U.S. jurisdictions) CDC Data | Updated August 2022




Objective #2:
Create messaging
for late
summer/early fall
in Spanish and
Indigenous
languages that
can easily be
shared in audio

Please share messages that will be
important for late summer/fall in
chat box or verbally.

- [Testing](#)
- [Tested Positive](#)
- [Vaccine](#)
- [Boosters](#)
- [Treatment](#)
- Protective behaviors

Call to action
messaging
discussion for data
infographics



Ayuda a detener la propagación del COVID-19



USA TU
MÁSCARA.

VACÚNATE.

REÚNETE
AFUERA.

Vacúnete
WA 
vacunaDeCovidWA.org

Las infecciones de COVID-19 están aumentando en todo WA.

¿Qué podemos hacer?



Si has estado esperando para vacunarte, ahora es cuando.



Si no te has puesto tu(s) dosis de refuerzo, haz una cita hoy.



Considera usar una máscara en lugares con mucha gente, aunque ya tengas todas tus vacunas.

Vacúnete
WA 

¿SE SIENTE ENFERMO?

**NO ESPERE: HÁGASE UNA PRUEBA
DE COVID-19 HOY MISMO.**



**No espere. Busque ayuda hoy mismo.
El tratamiento debe iniciarse rápido para
que sea eficaz.**



¿SE SIENTE ENFERMO?

**NO ESPERE: HÁGASE UNA PRUEBA
DE COVID-19 HOY MISMO.**



**Hágase la prueba apenas
empiece a presentar síntomas.**



¿SE SIENTE ENFERMO?

**NO ESPERE: HÁGASE UNA PRUEBA
DE COVID-19 HOY MISMO.**



Si corre un riesgo elevado de enfermarse gravemente de COVID-19 y obtiene un resultado positivo en la prueba, es posible que pueda acceder a un tratamiento.



¿SE SIENTE ENFERMO?

**NO ESPERE: HÁGASE UNA PRUEBA
DE COVID-19 HOY MISMO.**



Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si el resultado es positivo.






Cómo funciona los tratamientos de COVID-19

Antivirales

Las partículas del virus se multiplican dentro del cuerpo



Medicamento antiviral evita que el virus se multiplique

**La vacuna contra el
COVID-19 para niños
ya está aquí**



ESTOY INMUNOCOMPROMETIDO

¿Se me recomienda recibir estas dosis?

		¿Debo recibir una dosis adicional?	¿Debo recibir un refuerzo?	Dosis totales
If you got... Pfizer	Dos dosis administradas 21 días aparte para las personas de 5 años en adelante.	Sí , las personas de 5 años en adelante que están moderada o gravemente inmunocomprometidas deben recibir una dosis adicional 28 días después de su segunda inyección.	Sí , se recomienda una dosis de refuerzo de Pfizer ARNm (mRNA) 3 meses después de la última dosis para niños de 5 a 11 años.	4
	Tres dosis administradas para niños de 6 meses a 4 años. Las dos primeras dosis deben administrarse con 21 días de diferencia y la tercera dosis 8 semanas después de la segunda inyección.	No , los niños de 6 meses a 4 años con inmunodepresión moderada o grave no deben recibir una dosis primaria adicional en este momento.	Sí , se recomienda una dosis de refuerzo 3 meses después de la última dosis. Se debe recibir un segundo refuerzo de ARNm (mRNA) 4 meses después del primer refuerzo para las personas de 12 años o más.	5
If you got... Moderna	Dos dosis administradas con 28 días de diferencia para las personas de 6 meses en adelante.	Sí , las personas de 6 meses en adelante que están moderada o gravemente inmunocomprometidas deben recibir una dosis adicional 28 días después de su segunda inyección.	No , se recomienda una dosis de refuerzo para las personas de 6 meses a 17 años que recibieron Moderna como su primera serie.	3
			Sí , se recomienda una dosis de refuerzo 3 meses después de la última dosis. Se debe recibir un segundo refuerzo de ARNm (mRNA) 4 meses después del primer refuerzo para las personas de 18 años o más.	5
If you got... Johnson & Johnson	Una dosis autorizada para personas de 18 años o más.	Sí , las personas de 18 años o más que están moderada o gravemente inmunocomprometidas deben recibir una dosis adicional de la vacuna Pfizer o Moderna 28 días después de la primera dosis de J&J.	Sí , una dosis de refuerzo de ARNm (mRNA) al menos 2 meses después de la última dosis vacuna para personas de 18 años o más para estar al día. Si recibió una dosis primaria y de refuerzo de J&J, se debe recibir un segundo refuerzo de la vacuna de ARNm (mRNA) 4 meses después del primer refuerzo.	4

¿Preocupado de la variante BA.2?

Aquí hay unos tips para mantenerte seguro

Vacúnate y mantente al día
con tu vacuna de refuerzo

Usa tu mascarilla y evita
lugares con poca ventilación

Ten un plan para pruebas
rápidas y acceso al tratamiento

Saber cómo y cuándo aislarte



Creating Messaging & Next Steps



Identify messages
needed together



Get plain talked DOH
talking points



Together review and
tailor messaging for
community



Thank you for
your
contribution
today!



Next Workgroup

- ☐ August 25th
- ☐ September 15th
- ☐ October 20th
- ☐ November 17th
- ☐ December 15th