

Comprendre les résultats de votre test de dépistage de l'hépatite B*



Le panel d'analyses de sang réalisé pour le dépistage de l'hépatite B comprend trois tests. Les trois résultats doivent être connus afin de confirmer votre statut. Le tableau ci-dessous explique les résultats les plus courants aux tests, il est toutefois possible d'obtenir des résultats inhabituels.

REMARQUE : ce tableau ne constitue pas un avis médical. Consultez votre professionnel de santé pour obtenir une explication complète et une copie imprimée de vos résultats de tests.

HBsAg Test de l'antigène de surface de l'hépatite B	anti-HBs (HBsAb) Test d'anticorps de surface de l'hépatite B	anti-HBc (HBcAb) Test d'anticorps de base de l'hépatite B	Ce que signifient les résultats	CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
⊖	⊖	⊖	Vous n'êtes pas immunisé/pas protégé · Vous n'êtes pas infecté et vous n'avez pas été infecté par le passé. · Vous présentez un risque d'infection par l'hépatite B.	Un vaccin est nécessaire
⊖	⊕	⊖	Vous êtes immunisé/protégé · Vous n'avez pas été infecté. · Vous êtes immunisé car vous êtes vacciné contre l'hépatite B.	Aucun vaccin n'est nécessaire
⊖	⊕	⊕	Vous êtes immunisé par une infection naturelle · Vous vous êtes rétabli d'une infection antérieure par l'hépatite B. · Vous ne pouvez pas infecter d'autres personnes.	Aucun vaccin n'est nécessaire · Informez tous vos médecins de vos résultats de test de dépistage de l'hépatite B. · Parlez à votre médecin avant de prendre des traitements immunosuppresseurs car ils peuvent augmenter le risque de réactivation de l'hépatite B.
⊕	⊖	⊕	Vous êtes infecté · Le virus de l'hépatite B est présent dans votre sang. · Vous pouvez transmettre le virus de l'hépatite B à d'autres personnes.	Vous devez faire d'autres tests · Trouvez un médecin pour réaliser une évaluation et d'autres tests. · Informez tous vos médecins de vos résultats de test de dépistage de l'hépatite B. · Assurez-vous que votre partenaire et les personnes qui vivent avec vous se fassent tester et vacciner.
⊖	⊖	⊕	Vous pourriez être infecté · Résultat incertain - possibilité d'une infection antérieure ou actuelle par l'hépatite B.	Vous devez faire d'autres tests · Trouvez un médecin pour réaliser une évaluation et d'autres tests. · Informez tous vos médecins de vos résultats de test de dépistage de l'hépatite B. · Parlez à votre médecin avant de prendre des traitements immunosuppresseurs car ils peuvent augmenter le risque de réactivation de l'hépatite B. · Assurez-vous que votre partenaire et les personnes qui vivent avec vous se fassent tester et vacciner.