

COVID-19 백신 - 1가 vs 2가



COVID-19 백신을 설명하는 데 사용되는 '1가' 또는 '2가'라는 용어를 들어 보셨을 것입니다. 이 두 가지 유형 백신 간의 차이점과 접종 대상인 경우 개량 2가백신 부스터샷接种의 중요성에 대해 알려드립니다.

1가백신과 2가백신의 차이점은 무엇인가요?

1가백신은 바이러스의 한 종류 또는 성분이 함유된 백신입니다.

2가백신은 바이러스의 두 종류 또는 성분이 함유된 백신입니다.

어떤 COVID-19 백신이 1가이고 어떤 것이 2가인가요?

모든 기본 시리즈 및 기존 부스터샷接种을 위한 COVID-19 백신은 1가*입니다. 이 백신은 COVID-19 감염병을 유발하는 바이러스 원종으로 제조되었습니다.

개량 Pfizer 및 Moderna COVID-19 부스터샷接种은 2가입니다. 이들은 COVID-19 원종과 새로운 오미크론 변종인 BA.4 및 BA.5로 제조되었습니다.

2가백신이 1가백신보다 더 효과적인가요?

개량 백신 부스터샷接种에 대한 초기 임상 시험에서 2가백신 COVID-19 부스터샷接种은 1가 부스터샷接种보다 COVID-19 감염병에 대해 더 광범위한 예방 효과를 제공하고 특히 오미크론 변이로 인한 위중증 및/또는 사망으로부터 예방 기간을 연장할 수 있는 것으로 나타났습니다.

**Novavax 부스터샷接种은 1가백신이며 기본 시리즈 백신接种을 완료했지만 이전에 COVID-19 부스터샷接种을 받은 적이 없고 개량 2가백신 mRNA 부스터샷接种을 받을 수 없거나 받지 않을 성인의 경우 이용할 수 있습니다. Novavax 부스터샷은 오미크론 변종을 대상으로 하지 않습니다.*

2가백신 부스터샷接种이 왜 중요한가요?

현재 미국에서 유행하고 있는 가장 우세한 COVID-19 오미크론 변이를 예방하기 위해 제조된 유일한 종류의 COVID-19 백신인 만큼 2가백신 부스터샷接种은 중요합니다.

이미 COVID-19에 확진된 적이 있거나 이전에 1가백신 부스터샷接种을 받은 경우 2가백신 부스터샷接种을 받아야 하나요?

예, 이전에 COVID-19에 확진된 적이 있거나 1가백신 부스터샷接种을 받은 경우에도, 자격 대상이면 개량 2가백신 부스터샷接种이 권고됩니다. 예방 효과를 극대화하기 위해 최근 COVID-19 확진자는 개량백신 부스터샷接种을 포함한 COVID-19 백신接种을 증상 시작일 또는 양성 판정일로부터 3개월 후로 연기하는 것을 고려할 수 있습니다.

특정 브랜드의 2가백신 부스터샷接种을 받아야 하나요?

생후 6개월~4세 아동은 기본 시리즈와 동일한 브랜드의 개량 2가백신을接种하는 것이 좋습니다.

Pfizer 기본 시리즈接种을 완료한 5세 아동의 경우 Pfizer 개량 2가백신으로만 부스터샷接种받을 수 있습니다.

Moderna 기본 시리즈接种을 완료한 5세 아동의 경우 Moderna 또는 Pfizer 개량 2가백신으로 부스터샷接种받을 수 있습니다.

6세 이상은 기본 시리즈로接种받은 백신 브랜드에 관계없이 Moderna 또는 Pfizer 2가백신으로 부스터샷接种받을 수 있습니다.