

കോവിഡ്-19 വാക്സിൻ ബുസ്റ്റർ ഡോസുകൾ എല്ലാ പ്ലായകാർക്കുമുള്ള റഫറൻസ് ഗൈഡ്



താഴെകളെയും മറ്റെല്ലാവരെയും ഗുരുതരമായ അസുഖം, ആശുപത്രിയിൽ പ്പ്രവേശിപ്പിക്കൽ, കോവിഡ് -19 മൂലമുള്ള മരണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് താഴെകളോ താഴെകളുടെ കുടിയേറിയ കോവിഡ് -19 വാക്സിന്റെ പ്ലൈമറി സീരീസിൽ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് -19 വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കാലക്രമേണ അവി നൽകുന്ന പരിരക്ഷ കുറയാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ബുസ്റ്റർ എടുക്കുന്നത് ഈ സംരക്ഷണം തുടരുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമായിരിക്കുന്നു.

താഴെകളോ താഴെകളുടെ കുടിയേറിയ കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ ബുസ്റ്ററിന് അർഹനോ എന്നറിയാൻ താഴെയുള്ള ചാർട്ട് പരിശോധിക്കുക.*

താഴെകൾക്ക്... ഉണ്ട്...യിൽ	ആരാണ് ബുസ്റ്റർ എടുക്കേണ്ടത്	ഏത് ബുസ്റ്ററാണ് എടുക്കേണ്ടത്	ബുസ്റ്റർ എപ്പോൾ എടുക്കണം
Moderna	6 മാസവും അതിൽ കൂടുതലും പ്ലായമുള്ള ആളുകൾ	6 മാസം മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെ പ്ലായമുള്ള കുടികൾ- അവരുടെ പ്ലൈമറി സീരീസിന്റെ അതേ ബ്രാൻഡായ പുതുക്കിയ ബൈവാലന്റ് ഡോസ് സ്പീകരിക്കണം.	അവസാന ഡോസ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് 2 മാസത്തിന് ശേഷം (പ്ലൈമറി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോവാലന്റ് ബുസ്റ്റർ)
		5 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ആളുകൾ Pfizer അല്ലെങ്കിൽ Moderna യുടെ പുതുക്കിയ ബൈവാലന്റ് ബുസ്റ്റർ ഡോസ് സ്പീകരിക്കണം.	
		18 വയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്ലായമുള്ളവർ മുപ്പ് ബുസ്റ്റർ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഒരു നവീകരിച്ച mRNA ബുസ്റ്റർ സ്പീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു Novavax ബുസ്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.	പ്ലൈമറി സീരീസിന് കുറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും ശേഷം.
Pfizer	5 വയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്ലായമുള്ളവർ	Pfizer സ്പീകരിച്ച 5 വയസ്സുള്ള കുടികൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത Pfizer ബൈവാലന്റ് ബുസ്റ്റർ മാത്രമേ സ്പീകരിക്കാവൂ.	അവസാന ഡോസ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് 2 മാസത്തിന് ശേഷം (പ്ലൈമറി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോവാലന്റ് ബുസ്റ്റർ)
		6 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പ്ലൈമറി സീരീസ് ഏതെന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ബൈവാലന്റ് Pfizer അല്ലെങ്കിൽ Moderna ബുസ്റ്റർ സ്പീകരിക്കേണ്ട.	
		18 വയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്ലായമുള്ളവർ മുപ്പ് ബുസ്റ്റർ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഒരു നവീകരിച്ച mRNA ബുസ്റ്റർ സ്പീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു Novavax ബുസ്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.	പ്ലൈമറി സീരീസിന് കുറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും ശേഷം.
Johnson & Johnson	18 വയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്ലായമുള്ളവർ	18 വയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്ലായമുള്ളവർ ഒരു പുതുക്കിയ ബൈവാലന്റ് Pfizer അല്ലെങ്കിൽ Moderna ബുസ്റ്റർ സ്പീകരിക്കണം.	അവസാന ഡോസ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് 2 മാസത്തിന് ശേഷം (പ്ലൈമറി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോവാലന്റ് ബുസ്റ്റർ)
		18 വയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്ലായമുള്ളവർ മുപ്പ് ബുസ്റ്റർ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഒരു നവീകരിച്ച mRNA ബുസ്റ്റർ സ്പീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു Novavax ബുസ്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.	പ്ലൈമറി സീരീസിന് കുറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും ശേഷം.
Novavax	12 വയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്ലായമുള്ളവർ	12 വയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്ലായമുള്ളവർ ഒരു പുതുക്കിയ ബൈവാലന്റ് Pfizer അല്ലെങ്കിൽ Moderna ബുസ്റ്റർ സ്പീകരിക്കണം.	പ്ലൈമറി സീരീസിന് കുറഞ്ഞത് 2 മാസത്തിനു ശേഷം.
		18 വയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്ലായമുള്ളവർ മുപ്പ് ബുസ്റ്റർ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഒരു നവീകരിച്ച mRNA ബുസ്റ്റർ സ്പീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു Novavax ബുസ്റ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.	പ്ലൈമറി സീരീസിന് കുറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും ശേഷം.

താഴെകൾ മിതമായതോ ഗുരുതരമായതോ ആയ രീതിയിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.



*അടുത്തിടെ സാർസ്-കോവ്-2 അണുബാധയുണ്ടായവർക്ക് അവരുടെ കോവിഡ്-19 പ്ലൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ബുസ്റ്റർ ഡോസ്, രോഗലക്ഷണം ആരംഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ 5 സെപ്റ്റംബർ 2022 ആയിരുന്നിട്ട് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ വെക്കിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് (അണുബാധ ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ). അണുബാധയ്ക്കും വാക്സിനേഷനും ഇടയിലുള്ള സമയകൂടുതൽ വാക്സിനേഷനോടുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട രോഗപ്രതിരോധ പരിരക്ഷയ്ക്കായി കാരണമായേക്കാമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഇംഗ്ലീഷിൽ). കൂടാതെ, അണുബാധയെ തുടർന്ന് ആഴ്ചകൾ മുതൽ മാസങ്ങൾ വരെ വീണ്ടും അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള നരീയ അപകടസാധ്യത നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ്-19 ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത, കോവിഡ്-19 കമ്യൂണിറ്റി ലഭവൽ (ഇംഗ്ലീഷിൽ) അല്ലെങ്കിൽ പ്ലായന സാർസ്കോവ്-2 സ്പ്രെയിനിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ പൊതുവെ വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങൾ അണുബാധയ്ക്കും ശേഷം ബുസ്റ്റർ ഡോസ് സ്പീകരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കണം.

കോവിഡ്-19 വാക്സിൻ ബുസ്റ്റർ ഡോസുകൾ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത/ബൈവാലന്റ് ബുസ്റ്റർ?

യഥാർത്ഥ കോറോണ വൈറസ് സ്ട്രെയിനുകളെതിരെ പരിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിലവിലെ കേസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും കാരണമാകുന്ന പുതിയ ഒമിക്രോൺ വകഭേദങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ഫോർമുലയാണ് പുതുക്കിയ / ബൈവാലന്റ് കോവിഡ് -19 ബുസ്റ്റർ. വൈറസിനെതിരെ പരമാവധി സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനും വാക്സിന്റെ കാലക്രമേണ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫലപ്രാപ്തിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് പുതുക്കിയ ബുസ്റ്ററുകൾ.

ബുസ്റ്റർ ഡോസുകളുടെ പര്യാപ്തം എന്താണ്?

ഗുരുതരമായ രോഗത്തിനെതിരെ തുടർച്ചയായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ബുസ്റ്റർ ഡോസുകൾ സഹായിക്കും. 6 മാസവും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വാക്സിനേഷനുമായി കാലികമായി തുടരാൻ ഒരു ബുസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കണം. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മിതമായതോ ഗുരുതരമായതോ ആയ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ ചിലർക്ക്, അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഡോസുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കൂടുതൽ പകർച്ചവ്യാധി വകഭേദങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും അമേരിക്കയിലുടനീളം കോവിഡ് -19 കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് വളരെയധികം പര്യാപ്തം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ബുസ്റ്റർ ഡോസുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തീർത്ഥം വാക്സിനുകൾ വേണ്ടരീതിയിൽ പരവർത്തികുന്നില്ല എന്ന് നോക്കോ?

അല്ല. യു.എസ്.യിൽ നിലവിലുള്ള കോവിഡ് -19 വാക്സിനുകൾ ഗുരുതരമായ രോഗം, ആശുപത്രിവാസം, മരണം കൂടാതെ പുതിയതായി ഉണ്ടാകുന്ന വകഭേദങ്ങൾക്കെതിരെയും നല്ല രീതിയിൽ പരവർത്തികുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണിത്? പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ നേരിയതും മിതമായതുമായ കോവിഡ് -19 ബാധയ്ക്കെതിരെ, പര്യായകേമിച് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളവർക്കിടയിലേ പരിരക്ഷ കുറയുന്നതായി കാണുന്നു. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ ചില വകഭേദങ്ങളിൽ നിന്ന് മിച് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനാണ് പുതുക്കിയ / ബൈവാലന്റ് ബുസ്റ്ററുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ബുസ്റ്റർ ഡോസ് അപ്ഡേയിന്റമെന്റിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് കണ്ടുവരേണ്ടത്?

താങ്കളുടെ/താങ്കളുടെ കുടിയുടെ വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് (ഇംഗ്ലീഷിൽ) ബുസ്റ്റർ ഡോസ് അപ്ഡേയിന്റമെന്റിനായി ദയവായി കണ്ടുപോകുക. അതിൽനിന്ന്, പരാമോ വാക്സിൻ സീരീസ് പൂർത്തിയായതായി ദാതാവിന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും. കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ദാതാവിന് താങ്കളുടെ റെക്കോർഡ് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു അധിക വാക്സിൻ ഡോസും ബുസ്റ്റർ ഡോസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ഒരു പ്ലൈമെറി വാക്സിൻ സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ശക്തമായ പരിരോധ പരിതരണം ഇല്ലാത്ത ചില രോഗികൾക്ക് (മുകളിലുള്ള പട്ടിക കാണുക) ഉള്ളതാണ് ഒരു അധിക ഡോസ്.

പരാമോ വാക്സിൻ സീരീസിന്റെ ഫലം കാലക്രമേണ ക്ഷയിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ശേഷം പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ ഒപ്പം /അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനോ ആണ് ഒരു ബുസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നത്.

ബുസ്റ്റർ ആയി ഏതു ബ്രാൻഡ് വാക്സിൻ ആണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുക?

6 മാസം മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെ പ്ലൈമെറി കൂട്ടികൾ അവരുടെ പ്ലൈമെറി സീരീസിന്റെ അതേ ബ്രാൻഡായ പുതുക്കിയ ബൈവാലന്റ് ഡോസ് സ്വീകരിക്കണം.

Pfizer പ്ലൈമെറി സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കിയ 5 വയസ്സ് പ്ലൈമെറി കൂട്ടികൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ബൈവാലന്റ് Pfizer ബുസ്റ്റർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ.

Moderna സ്വീകരിച്ച 5 വയസ്സുള്ള കൂട്ടികൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത Moderna അല്ലെങ്കിൽ Pfizer ബൈവാലന്റ് ബുസ്റ്റർ സ്വീകരിക്കാം.

6 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്ലൈമെറി സീരീസിനോ മുൻ ബുസ്റ്റർ ഡോസിനോ ഏത് ബ്രാൻഡ് സ്വീകരിച്ചാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത Pfizer അല്ലെങ്കിൽ Moderna ബുസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാം.

18 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ആളുകൾക്കും പ്ലൈമെറി സീരീസ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും മുൻപ് ഒരു COVID-19 ബുസ്റ്റർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ - അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത mRNA ബുസ്റ്റർ സ്വീകരിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ ഒരു Novavax ബുസ്റ്റർ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയി കണക്കാക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ ഒരു COVID-19 വാക്സിൻ പ്ലൈമെറി സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കുകയും സി.ഡി.സി. നിങ്ങളുടെ ശുപാർശ ചെയ്ത ഏറ്റെടുക്കലും പുതിയ ബുസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ COVID-19 വാക്സിനുകൾ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ കാലികമാണ്.

ഫലപ്രാപ്തി മറ്റ് വാക്സിനുകൾക്കൊപ്പം ബുസ്റ്റർ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ?

കഴിയും താങ്കൾക്കുമാത്രം താങ്കളുടെ കൂട്ടികൾക്കുമാത്രം മറ്റ് വാക്സിനുകളെപ്പോലെയെ തന്നെ ഒരേസമയം കോവിഡ് -19 വാക്സിനും സ്വീകരിക്കാം. താങ്കളുടെ കൂട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്കൂൾ വാക്സിനേഷനുകളോ (ഇംഗ്ലീഷിൽ) അല്ലെങ്കിൽ പര്യായകേമായി ശുപാർശ ചെയ്ത മറ്റ് വാക്സിനുകളോ കോവിഡ് -19 വാക്സിനേഷൻ മൂലം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ അപ്ഡേയിന്റമെന്റ് വഴി താങ്കൾക്കുമാത്രം താങ്കളുടെ കൂട്ടികൾക്കുമാത്രം ശുപാർശ ചെയ്ത മറ്റ് വാക്സിനുകൾ എടുക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ലഭിക്കുക.

കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? സന്ദർശിക്കുക: doh.wa.gov/covidbooster (ഇംഗ്ലീഷിൽ)

