

Guide de référence des vaccins COVID-19 pour les personnes immunodéprimées

Les personnes immunodéprimées sont particulièrement vulnérables aux infections, notamment le COVID-19. *Si vous présentez l'une des affections médicales suivantes, vous êtes considéré comme modérément à sévèrement immunodéprimé et pouvez bénéficier d'une dose supplémentaire de vaccin contre le COVID-19. Cela inclut les personnes qui :*

- » Vous recevez un traitement actif contre le cancer pour des tumeurs ou des cancers du sang.
- » Vous avez reçu une greffe d'organe et vous prenez des médicaments immunosuppresseurs.
- » Vous avez reçu une greffe de cellules souches au cours des 2 dernières années ou vous prenez des médicaments immunosuppresseurs.
- » Vous souffrez d'une immunodéficience primaire modérée ou grave (comme le syndrome de DiGeorge, le syndrome de Wiskott-Aldrich).
- » Vous êtes atteint d'une infection par le VIH qui est avancée ou non traitée
- » Vous recevez un traitement actif par corticostéroïdes à forte dose ou d'autres médicaments susceptibles de supprimer la réponse immunitaire.

Cette liste n'inclut pas toutes les formes d'immunodépression. Veuillez consulter votre médecin pour déterminer si des doses supplémentaires vous seraient bénéfiques. Si vous êtes immunodéprimé, consultez le tableau ci-dessous pour savoir combien de doses vous pouvez recevoir pour rester protégé contre le COVID-19 :

Si vous avez reçu...	Tranche d'âge	Schéma vaccinal initial	Dois-je recevoir une DOSE SUPPLÉMENTAIRE DE VACCIN MONOVALENT ?	Puis-je recevoir une DOSE DE RAPPEL ?
Moderna	Entre 6 mois et 4 ans	Deux doses, administrées à 28 jours d'intervalle	Oui, vous devez recevoir une dose supplémentaire 28 jours après votre deuxième dose.	Oui, les enfants âgés de 6 mois à 4 ans doivent recevoir une dose de vaccin modifié (bivalent) de la même marque que le vaccin reçu dans leur schéma vaccinal initial.
	5 ans	Deux doses, administrées à 28 jours d'intervalle	Oui, vous devez recevoir une dose supplémentaire 28 jours après votre deuxième dose.	Oui, les personnes âgées de 5 ans et plus doivent recevoir une dose de rappel du vaccin modifié (bivalent) de Pfizer ou Moderna.
	6+ ans	Deux doses, administrées à 28 jours d'intervalle	Oui, vous devez recevoir une dose supplémentaire 28 jours après votre deuxième dose.	Oui, une dose de rappel d'un vaccin bivalent à ARNm de Pfizer ou Moderna est recommandée 2 mois après la dernière dose pour les personnes âgées de 6 ans et plus afin d'être à jour de leurs vaccins. Les personnes âgées de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel précédemment peuvent également choisir de recevoir une dose de rappel du vaccin Novavax 6 mois après avoir terminé leur schéma vaccinal initial si elles ne peuvent pas, ou ne veulent pas, recevoir une dose de rappel d'un vaccin à ARNm actualisé.
Pfizer	Entre 6 mois et 4 ans	Trois doses : Les deux premières doses sont administrées à 21 jours d'intervalle ; la troisième dose est administrée 8 semaines après.	Pas de dose supplémentaire pour l'instant.	Non, pour le moment, l'administration d'une dose de vaccin modifié (bivalent) n'est pas autorisée chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans qui ont déjà reçu un schéma vaccinal initial du vaccin Pfizer.
	5 ans	Deux doses, administrées à 21 jours d'intervalle	Oui, vous devez recevoir une dose supplémentaire 28 jours après votre deuxième dose.	Oui, les enfants âgés de 5 ans qui ont reçu le vaccin Pfizer peuvent uniquement recevoir une dose de rappel du vaccin modifié (bivalent) de Pfizer.
	6+ ans	Deux doses, administrées à 21 jours d'intervalle	Oui, vous devez recevoir une dose supplémentaire 28 jours après votre deuxième dose.	Oui, une dose de rappel d'un vaccin bivalent à ARNm de Pfizer ou Moderna est recommandée 2 mois après la dernière dose pour les personnes âgées de 6 ans et plus afin d'être à jour de leurs vaccins. Les personnes âgées de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel précédemment peuvent également choisir de recevoir une dose de rappel du vaccin Novavax 6 mois après avoir terminé leur schéma vaccinal initial si elles ne peuvent pas, ou ne veulent pas, recevoir une dose de rappel d'un vaccin à ARNm actualisé.
Johnson & Johnson	18+ ans	Une dose	Oui, vous devez recevoir une dose supplémentaire d'un vaccin à ARNm 28 jours après votre 1ère dose du vaccin J&J.	Oui, une dose de rappel d'un vaccin bivalent à ARNm de Pfizer ou Moderna est recommandée 2 mois après la dernière dose afin d'être à jour de ses vaccins. Les personnes âgées de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel précédemment peuvent également choisir de recevoir une dose de rappel du vaccin Novavax 6 mois après avoir terminé leur schéma vaccinal initial si elles ne peuvent pas, ou ne veulent pas, recevoir une dose de rappel d'un vaccin à ARNm actualisé.
Novavax	12+ ans	Deux doses, administrées à 21 jours d'intervalle	Pas de dose supplémentaire pour l'instant.	Oui, une dose de rappel d'un vaccin bivalent à ARNm de Pfizer ou Moderna est recommandée 2 mois après la dernière dose pour les personnes âgées de 12 ans et plus afin d'être à jour de leurs vaccins. Les personnes âgées de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel précédemment peuvent également choisir de recevoir une dose de rappel du vaccin Novavax 6 mois après avoir terminé leur schéma vaccinal initial si elles ne peuvent pas, ou ne veulent pas, recevoir une dose de rappel d'un vaccin à ARNm actualisé.

Foire Aux Questions

Quelle est la différence entre une dose de vaccin supplémentaire et une dose de rappel ?

Une dose supplémentaire est destinée à certains patients (voir tableau ci-dessus) qui ont reçu un schéma vaccinal initial mais n'ont pas obtenu une réponse immunitaire suffisante.

Une dose de rappel est administrée pour renforcer ou rétablir la protection et/ou l'immunité après que l'efficacité du schéma vaccinal initial se soit affaiblie avec le temps.

Quelles affections médicales sous-jacentes vous exposent à un risque plus élevé de maladie grave due au COVID-19 ?

Les personnes de tout âge souffrant des affections énumérées ci-dessous (en anglais seulement) sont plus susceptibles de tomber gravement malades en cas d'infection par le COVID-19.

Les vaccins contre le COVID-19 (doses initiales et doses de rappel) et les autres mesures de prévention contre le COVID-19 sont importants, en particulier si vous êtes plus âgé ou si vous avez des problèmes de santé multiples ou graves, y compris les affections figurant dans cette liste. Cette liste n'inclut pas toutes les affections possibles qui vous exposent à un risque accru d'une forme grave de COVID-19. Si vous souffrez d'une maladie qui n'est pas citée ici, demandez à votre médecin comment gérer au mieux votre maladie et vous protéger contre le COVID-19.

- » Cancer
- » Maladie chronique des reins
- » Maladie chronique du foie
- » Maladie chronique des poumons
- » Démence ou autres troubles neurologiques
- » Diabète (type 1 ou 2)
- » Trisomie 21
- » Problèmes cardiaques
- » Infection par le VIH
- » État immunodéprimé (système immunitaire affaibli)
- » Troubles de santé mentale
- » Surpoids et obésité
- » Grossesse
- » Drépanocytose ou thalassémie
- » Tabagisme, actuel ou ancien
- » Transplantation d'un organe solide ou de cellules souches du sang
- » Accident vasculaire cérébral ou maladie cérébrovasculaire, qui affecte la circulation du sang dans le cerveau.
- » Troubles de la toxicomanie
- » Tuberculose

Qu'est-ce qu'une dose de rappel d'un vaccin actualisé/bivalent ?

Une dose de rappel d'un vaccin COVID-19 actualisé/bivalent est une formule vaccinale qui renforce l'immunité contre la souche originale du coronavirus et protège également contre les variants plus récents du virus qui sont à l'origine de la plupart des cas actuels. Les doses de rappel de vaccins actualisés visent à fournir une protection optimale contre le virus tout en remédiant à la diminution de l'efficacité du vaccin au fil du temps.

Les personnes présentant une immunodépression modérée ou sévère auront-elles besoin d'une note/ordonnance d'un médecin ou d'un autre document pour se voir administrer ces doses ?

Non, ces personnes peuvent s'identifier elles-mêmes et ainsi bénéficier de toutes les doses partout où les vaccins sont proposés. De cette manière, il sera possible de s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles supplémentaires à l'accès au vaccin pour cette population. Si les personnes immunodéprimées ont des questions sur leur état de santé spécifique, elles peuvent discuter avec leur prestataire de soins de santé pour savoir si l'administration d'une dose supplémentaire est appropriée dans leur cas.

Si je reçois un vaccin contre le COVID-19, dois-je quand même prendre d'autres précautions ?

Oui, même si vous êtes vacciné, vous pouvez avoir l'obligation de porter un masque à l'intérieur dans certains lieux publics. Trouvez de plus amples informations sur la [page de notre FAQ relative au port du masque](#) (en anglais). Nous vous conseillons également de vous laver régulièrement les mains, de respecter une distanciation physique de 2 mètres et de limiter les rassemblements.

Les vaccins COVID-19 fonctionnent bien, mais ils ne sont pas efficaces à 100 %. Certaines personnes peuvent contracter le COVID-19 même en ayant été vaccinées. Avec l'apparition de variants plus transmissibles, il est important que chacun prenne des précautions, comme porter un masque, pour réduire la transmission du virus.

D'autres questions ? Consultez : doh.wa.gov/covidbooster